

## Catalogue des types de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) conservés au Muséum d'histoire naturelle, Genève

Jeannine MORATI

27 chemin du pont, Grésin, F-01200 Léaz, France.

**A catalogue of the types of Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) housed in the Muséum d'histoire naturelle, Geneva.** - A list is provided of 218 holotypes, the syntypes of 15 species and subspecies, and paratypes of 129 species and subspecies of the Lamiinae presently housed in the Muséum d'histoire naturelle, Geneva. Most of the names were published by S. Breuning. As the taxonomic treatment of the Lamiinae was often inadequate it was necessary to check the original descriptions for all names listed. The authenticity of several "types" is found doubtful. They are indicated by "?HP" or "?PT". Unpublished information from labels is given in square brackets. Illegible handwritten text is indicated by the sign □. When a description was published twice, a reference to the second description is given in parentheses. Separate lists are given for type material of varieties published before 1961, and for unavailable names published with designation of type material.

**Key-words:** Coleoptera – Cerambycidae – Lamiinae – type material.

### INTRODUCTION

Le Muséum d'histoire naturelle de Genève (MHNG) possède une collection de Lamiinae qui compte quelques 5000 espèces. Elle consiste en une collection historique de A. Melly à laquelle se sont ajoutés les collections H.-A. Junot, R. Mussard, W. Siess, les récoltes faites par les entomologistes du Muséum ainsi que des lots importants cédés par S. Breuning.

Cette collection contient de nombreux spécimens étiquetés holotype, paratype ou syntype. Pour la plupart, il s'agit de taxa décrits par Breuning qui, au cours de soixante ans consacrés à l'entomologie, a étudié la plupart des collections de *Lamiinae* des principaux musées européens et publié environ 630 articles dont plus de 600 sont consacrés aux *Lamiinae*. Les spécimens types des espèces qu'il a décrites se retrouvent dispersés dans ces différentes institutions et il paraissait utile d'établir une liste des noms de ces taxa, conformément à la recommandation 72F 4 du Code International de Nomenclature Zoologique (4<sup>e</sup> éd., 1999), pour faciliter le travail des réviseurs potentiels qui, en plus des difficultés découlant des anciennes définitions sommaires des taxa, se trouvent souvent dans l'impossibilité de localiser le matériel typique indispensable à toute étude.

## MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les sources principales ont été le Catalogue des Lamiaires du Monde (Breuning, 1958-1969), la bibliographie de Breuning (Breuning, 1984), les Zoological Records et les descriptions originales des différents auteurs.

Les noms des taxa sont écrits suivant l'orthographe (éventuellement complétée par l'orthographe subséquente reconnue), la combinaison et le statut originaux. Ils sont répertoriés alphabétiquement, sans mention de sous-genre ni de tribu. La localité type est donnée pour chaque nom comme publiée. La page indiquée correspond à la première page sur laquelle le nom a été introduit. La date relevée est celle de la parution effective, suivie entre parenthèses de la date imprimée sur la publication, quand elles sont différentes. En cas d'homonymie, les références relevées concernent l'espèce en collection. Les références bibliographiques sont apportées in extenso en fin de catalogue. Quand une même description «originale» est publiée deux fois, la deuxième publication est notée entre parenthèses. Breuning ayant diversement signé ses publications: Stephan von Breuning, S. Breuning ou Etienne de Breuning, dans un souci d'homogénéité, l'orthographe «Breuning S.» a été choisie, suivie de (E.) quand la signature est francisée, la particule n'est pas mentionnée. Certaines informations d'étiquettes manuscrites illisibles, sont notées ill.: quand seules certaines lettres sont illisibles, elles sont remplacées par □. Le terme «type» est transcrit holotype quand la description originale le précise ou quand elle ne s'appuie que sur un seul spécimen, syntype quand elle s'appuie sur plusieurs spécimens ou quand les spécimens sont notés cotypes (CT). Contrairement à ce qui a été écrit (Breuning, 1974), les types de la collection Chassot n'ont pas été déposés au MHNG (communication personnelle, Besuchet, 1999).

Certaines incohérences ayant été décelées, il paraissait nécessaire de vérifier l'authenticité «en tant que type» de ces spécimens et la disponibilité de leur nom. La validité de ces noms n'a cependant pas été contrôlée.

- *Holotypes, syntypes*. L'authenticité des spécimens en tant que porte-nom a été établie par le contrôle avec les descriptions originales. Il nous a semblé préférable de donner la priorité aux informations de ces dernières qui font référence, leur accord avec les informations des étiquettes présumant de l'authenticité du spécimen. Sont considérés comme authentiques les «types» dont les données des étiquettes correspondent à celles de la description originale, ils sont notés **HT** ou **ST**. Quand les données des étiquettes complètent l'information publiée, elles sont apportées entre crochets. Quand les données des étiquettes sont en contradiction avec celles de la description originale ou quand le lieu de dépôt mentionné n'est pas le MHNG, les «types» sont considérés comme douteux, ils sont notés **?HT** ou **?ST**, les informations contradictoires sont alors notées entre crochets.

- *Paratypes*. Leur authenticité est difficilement vérifiable. Ils ne sont pas toujours mentionnés dans les descriptions originales et quand ils le sont, leur nombre n'est que rarement indiqué, leur lieu de conservation a pu changer étant souvent utilisés pour des échanges par les collectionneurs privés. Conventionnellement, sont présumés authentiques les «paratypes» dont les données des étiquettes correspondent à celles de la description originale **et** dont il est fait mention dans celle-ci. Ils sont notés **PT**. Sont

considérés comme douteux les «paratypes» qui ne sont pas mentionnés dans la description, ceux dont les informations des étiquettes et de la description sont contradictoires ou ceux qui se trouvent en «surnombre», ils sont notés ?PT. N'ont pas été mentionnés ceux portant une date de récolte postérieure à celle de la description!

La disponibilité des noms a été établie selon les dispositions du Code International de Nomenclature Zoologique, 4<sup>e</sup> éd., 1999 (ICZN).

- Les noms du niveau espèce et sous-espèce publiés comme tels sont répertoriés dans la **liste 1**. Celle-ci compte 218 holotypes, 17 syntypes de 15 espèces et 203 paratypes de 129 espèces pouvant être considérés comme authentiques. Il s'agit principalement de représentants de la tribu des Saperdini (*Oberea*: 50 holotypes, 1 syntype et 36 paratypes de 25 espèces; *Phytoecia*: 36 holotypes, 2 syntypes de 2 espèces et 14 paratypes de 9 espèces).

- Les noms publiés en tant que «variété» avant 1961, sont disponibles (ICZN: art. 45.6.4) et répertoriés dans la **liste 2** (1 holotype et 2 syntypes d'une espèce).

- Les noms infra-subspécifiques autres que ceux de «variété» ou «forme» publiés avant 1961, ne sont pas disponibles, sauf s'ils ont été utilisés au niveau subspécifique avant 1985 (ICZN: art. 45.6.4.1.) (ce que nous n'avons pas vérifié dans ce travail). Tous ces noms sont donc répertoriés dans la **liste 3**. Les noms du niveau infra-subspécifique publiés après 1960, bien que n'étant pas disponibles (ICZN: art. 45.6.2. et 45.6.3) sont également répertoriés dans la **liste 3**.

- Les noms de collection n'ont pas été retenus pour éviter une interprétation erronée de leur disponibilité, mais pourraient être communiqués sur demande, sous forme d'une liste. Cette liste répertorie les noms du niveau espèce, sous-espèce ou infra-subspécifique pour lesquels aucune référence n'a été trouvée dans la littérature. Il pourrait s'agir d'espèces non décrites, d'espèces renommées ou corrigées par Breuning ou encore de noms ayant échappé à notre vigilance. Elle répertorie également des noms pour lesquels des notes inédites de Breuning ont été retrouvées.

## LISTE 1: NOMS DU NIVEAU ESPÈCE ET SOUS-ESPÈCE

*Abryna coenosa mindanaonis* Breuning, 1980e: 169.

2 ?PT: [Insel Mindanao].

*Acalolepta australis orientalis* Breuning, 1982: 18.

PT: Papouasie, archipel de la Louisiade, île Sud-Est, IV.1898, Meek coll.

*Acalolepta australis saintaignani* Breuning, 1970a: 377 (Breuning, 1982: 18).

3 PT: St. Aignan, 8.IX.1897 [Meek coll.]; 2 ?PT: [St Aignan, VIII-XI.97, Meek].

*Acalolepta brunnescens* Breuning, 1980e: 175.

3 ?PT: [Insel Mindanao].

*Acalolepta densefuscomarmorata* Breuning, 1982: 19.

?PT: [Woodlark, Meek, 95].

*Acalolepta densemarmorata* Breuning, 1970b: 475.

PT: Neu Hannover, II-III.97, Webster.

*Acalolepta holobrunnea* Breuning, 1980e: 174.

3 PT: Insel Mindanao.

*Acalolepta lumawigi* Breuning, 1980e: 175.

?PT: [Philippines, Insel Mindanao].

*Acalolepta meeki* Breuning, 1982: 18.

PT: Papouasie, archipel de la Louisiade, Ile Sud-Est, IV.1898, Meek coll.

*Acalolepta paravariolaris* Breuning, 1980e: 175.

?PT: [Insel Mindanao].

*Acalolepta saintaignani* Breuning, 1982: 18.

2 PT: Papouasie, archipel de la Louisiade, île Saint-Aignan, VIII-XI.1897, Meek coll.

*Acalolepta woodlarkiensis* Breuning, 1970b: 476.

?PT: [Woodlark, Meek, 95].

*Acridoschema mbargai* Breuning, 1972a: 282.

PT: Cameroun, M'Balmayo, II.72, leg. M'Barga.

*Agapanthia fallax* Holzschuh, 1974 (1973): 95.

PT: Anatolie, prov. Mus, Buglanceçidi, 1600m, 11-17.VI.1973, Holzschuh.

*Agelasta albesignata* Breuning, 1980e: 158.

?PT: [Philippines, Mindanao, leg. Lumawig].

*Agelasta albostictica* Breuning, 1980e: 158.

4 ?PT: [Insel Mindanao].

*Agelasta mediofasciatipennis* Breuning, 1974g: 78.

?PT: [Philippines, Luzon, Prov. Benguet S.P., Baguio].

*Amblymora obiensis* Breuning, 1956d: 685.

HT: Ile Obi, ex coll. Preiss, coll. Lepesme [Moluques].

*Anauxesis rufipennis* Breuning, 1976b: 738.

HT: Kenya, Shimba Hills, près Kwale, 29.XI.1974, leg. V. Mahnert et J. Perret [près Madabara, Pumping station, tamisage].

*Anauxesis rufoscapa* Breuning, 1950b: 7.

HT: Transvaal, Shilouvane, leg. H. Junod.

*Ancylonotopsis pictoides* Breuning, 1974d: 775.

?PT: [Ht Zaïre, Kingansani].

*Anexodus sarawakensis* Sudre, 1997: 253.

HT: ♂, E. Malaisie, Sarawak, confl. Sun Oyan, et Mujong river, E. Kapit, 500m, 18.V.1994, Löbl et Burckhardt; 2 PT ♂ et ♀: idem.

*Annamanum fuscomaculatum* Breuning, 1979b: 99.

?PT: [Yunnan, Peyentsin]; 2 ?PT: [Yunnan, Djoukoula].



*Apriona yayeyamai* Breuning, 1976b: 739.

HT: ♂, Japon, Ile Ishigakishima, Yayayama, leg. Ohbayashi.

*Arachneosomatidia beatricea* Sudre, 2000: 83.

HT: New Caledonia, Mt Khogi, prim. for., 400-500m, litter, 18-19.X.1998, Löbl; PT: idem.

*Astathes bimaculatoides* Breuning, 1971a: 3.

?PT: [Laos, Paksé, Coll. Rondon]; 2 ?PT: [Laos, Paksé, 31.V.67]; 2 ?PT: [idem mais 15.VI.67].

*Australiorondonia australica* Breuning, 1982: 25.

3 PT: Australia.

*Bacchisa nigricornis* Breuning, 1969a: 37.

HT: ♂, Laos, Pa-Hia, 19.IV.50, leg. J. Romieux.

*Batrachorhina rodriguezi* Breuning, 1948: 22.

PT: Rodrigues, 1934, Dr Madge.

*Blapsilon baloghi* Breuning, 1978a: 25.

2 PT: New Caledonia, Mont Rembai, 19-21.I.1977, leg. Dr J. Balogh.

*Blapsilon kaszabi* Breuning, 1978a: 26.

PT: New Caledonia, Mont Rembai, 19-21.I.1977, leg. Dr J. Balogh.

*Blepisanis disconotaticollis* Breuning, 1950c: 21.

2 PT: Kongo Belg. [Beni].

*Blepisanis flavovittata* Breuning, 1950c: 23.

?PT: [Congo, Elisabethville].

*Blepisanis guineensis* Kolbe, 1893: 78.

ST: Togo, Bismarckburg [1.VI-15.VII.91, R. Büttner S.].

*Blepisanis incallosa* Breuning, 1950d: 273.

?PT: [Angola, Bailundo].

*Blepisanis lineata* Aurivillius, 1913: 35.

ST: Angola, Bailundo.

*Blepisanis orientis* Aurivillius, 1910: 151.

2 ST: Kilimandjaro, Kibonoto, Kulturzone [S. Jöstedt, 1905-6, 1300m].

*Blepisanis subcallosa* Breuning, 1950c: 22.

2 ?PT: [Angola, Bailundo].

*Blepisanis uniformis* Breuning, 1950c: 19.

2 ?PT: [Angola, Bailundo].

*Brachychilus lituratus* Blanchard, 1851: 500.

ST: Chili, Santiago, Coquimbo, Illapel, Arquero, etc. [Chili, Santiago, Gay, 1849].

*Brachychilus scutellaris* Blanchard, 1851: 500.

ST: Chili, Santiago, Santa Rosa, etc. [Chili, Gay, 1849].

*Brachyolene unicolor* Breuning, 1974b: 372.

HT: Côte d'Ivoire, Sassandra, XII.1949, leg. R. Mussard.

*Cacia grossepunctata* Breuning, 1980e: 160.

?PT: [Insel Mindanao].

*Celosterna perakensis* Breuning, 1976b: 739.

HT: Malaisie, Perak, Taiping, 14.III.1972, leg. K.C. Liew.

*Cereopsius sexmaculatus immaculithorax* Breuning, 1974f: 238.

2 PT: Borneo, Maloewi [Coll. Besnard].

*Cereopsius spilotoides* Breuning, 1974a: 74.

HT: Philippines, Ile Luzon, Manila, Zambo, IX.1928, W. Parsons; PT: idem.

*Ceroplesis aestuans dakarensis* Fiedler, 1938: 591.

PT: Dakar [Afr. Occ., Dakar / det. H. Fiedler, 1937]; PT: Dakar [Sénégal, Dakar, Fr. West Africa / det. H. Fiedler, 1937].

*Ceroplesis aestuans ubangiensis* Fiedler, 1938: 592.

PT: Uganda [Brit. Uganda, Graner / det. H. Fiedler, 1937]; PT: Fort Crampel [det. H. Fiedler, 1937].

*Ceroplesis aulica jokoana* Fiedler, 1938: 603.

?PT: [Sd. Kamerun, Heyne, Berlin-Wilm. / det. H. Fiedler, 1937]; ?PT: [Tykargeb., ill., VIII.1912 / det. H. Fiedler, 1937].

*Ceroplesis calabarica lemekensis* Fiedler, 1938: 597.

PT: Nyanza Province, Salt Marsh [B.E.A].

*Ceroplesis calabarica ubangica* Fiedler, 1938: 594.

PT: Fort Crampel [Long, F.2 / det. H. Fiedler, 1937]; PT: Lado [Brit. Afr., A Heyne, Berlin-Wilm. / det. H. Fiedler, 1937]; ?PT: [Bamenida, 7.VII.05, Sch. / det. H. Fiedler, 1937]; ?PT: [Congo français / det. H. Fiedler, 1937].

*Ceroplesis capensis bamumica* Fiedler, 1938: 577.

PT: Bamum [Kamerun, Kutu, 1040m / det. H. Fiedler, 1937].

*Ceroplesis capensis camerunensis* Fiedler, 1938: 577.

PT: Fort Crampel [Congo français / det. H. Fiedler, 1937].

*Ceroplesis capensis usambarica* Fiedler, 1938: 575.

PT: Tanga [det. H. Fiedler, 1937].

*Ceroplesis hauseri conjuncta* Hintz, 1920 (1918): 172.

HT: Deutsch-Ostafrika, Njassasee.

*Ceroplesis hottentotta natalensis* Fiedler, 1938: 612.

2 PT: Natal [det. H. Fiedler, 1937].

*Ceroplesis orientalis natalensis* Fiedler, 1938: 605.

PT: Natal [det. H. Fiedler, 1937].

*Ceroplesis semitrabeata nguruana* Fiedler, 1938: 608.

?PT: [Africa occid., Coll. Nonfried / det. H. Fiedler, 1937].

*Ceylanoparmena loebli* Breuning, 1971b: 306.

HT: Ceylan Central, Hatton, montagne boisée à l'est de la ville, 9.II.1970, 1400m, tamisage en forêt [Mussard, Besuchet et Löbl].

*Chariesthes nigroapicipennis* Breuning, 1977a: 266.

PT: Doum, Akono [12.VII.70 / Test cacao].

*Cleptometopus assamanus* Breuning, 1967a: 32.

HT: Inde, Manipur, 30.VIII.1960, leg. Schmid [Assam-Manipur, Langdang, 5300ft]; PT: idem [Assam-Manipur, Phaiphengmu, 5000ft].

*Cleptometopus grossepunctatus* Breuning, 1967a: 32.

HT: Assam, leg. Schmid [Kameng].

*Cleptometopus parolivaceus* Breuning, 1972c (1971): 416.

HT: Sikkim, Chumtang, 17.VII.1959, 1550m [Himalaya, Schmid].

*Cleptometopus scutellatus* Hüdepohl, 1996: 3.

HT: ♂, Sumatra, Jambi, W Mt Tujuh Lake, 1400m, 14.XI.1989, Agasti, Löbl, Burckhardt.

*Cleptometopus sikkimensis* Breuning, 1972c (1971): 416.

HT: Sikkim, Manu, 10.V.1959, 1500m [Himalaya, Schmid].

*Cleptometopus subteraeus* Breuning, 1967a: 33.

HT: Western Bengale, 15.XII.1959, leg. Schmid [Git Dabbling, 4900-5100ft].

*Conizonia chehirense* Breuning, 1943: 103.

HT: Anatolie, Ak-Chéir [1900]; ?PT: [Anatolien, Ak-Chehir, 1900, Korb].

*Coptops illicita rosacea* Breuning, 1980e: 157.

2 ?PT: [Insel Mindanao].

*Cristoberea assamensis* Breuning, 1954a: 531.

2 ?PT: [Assam, Shillang].

*Cristorhodopina mussardi* Breuning, 1966c: 15.

HT: Assam, 2.VI.1961, leg. Schmid, coll. Mussard [Kameng, Ithum La 2400m].

*Cylindrepomus grammicus hecate* Dillon et Dillon, 1948: 274.

PT: I. Salomon, Bougainville.

*Daphisia formosana* Schwarzer, 1925: 153.

ST: Formosa, Taihorin, 1911, H. Sauter.

*Dasyllinda javanica* Vuillet, 1912: 20.

ST: Java, Gounod Gedeh, Ledru 1898, coll. Oberthür.

*Declivocondyloides loebli* Sudre, 2000: 82.

HT: New Caledonia, Col des Roussettes, litter in ravine, 12.IX.1998, I. Löbl;  
PT: idem; PT: New Caledonia, La Trappe above St Louis, wood and leaf litter, 22.X.1998, I. Löbl.

*Diadelia betschii* Breuning, 1975: 260.

PT: Madagascar Centre, Andringitra Est, Ambalamarovandana, 1500-1600m, FDHMA, 15-25.I.1971 [15.I.1971].

*Dolichoprosopus philippinensis* Breuning, 1980e: 171.

?PT: [Ile Mindanao, coll. Lumawig].

*Dorcadion blandulus* Holzschuh, 1977: 131.

PT: Anatolien, prov. Bingöl, östlich des Kuruca geçidi, 1700m, 29.IV.1975, leg. C. Holzschuh et F. Ressler.

*Dorcadion brauni* Breuning, 1979a: 92.

6 PT: Anatolia occ., Tavas-ovasi ca. 1000m, 26.III.1978, Heinz leg., coll. Heinz;  
4 PT: Anatolie occ., Tavas, Heinz, 1000m, III.1978; 2 PT: Anatolie, Tavas, 1000m, III.78.

*Dorcadion calabricum* Breuning, 1942: 127.

?PT: [Calabrien, Antonimina, leg. Paganetti].

*Dorcadion czipkai* Breuning, 1973c: 54.

3 PT: Iran, Azarbaijan, Savelan, 2600m, 29.VII.1972, leg. W. Heinz.

*Dorcadion divisum subdivisum* Breuning, 1955b: 263.

PT: Anatolien, Ankara, V.1937, leg. Dr N. Vasvary.

*Dorcadion laevipunctatum* Breuning, 1944: 14.

?PT: [Maced., Ali Botus Exp., Maran et Taborsky lgt.].

*Dorcadion pedestre kaszabi* Breuning, 1956a: 404.

?PT: Hongrie centrale, Dömsöd, Apajpuszta, V.1953, Kaszab [1952, szikes leg-elo / egyelve IV.29 / leg. I. Kovacs].

*Dorcadion pseudinfernale* Breuning, 1943: 94.

?PT: [Mts Amanus].

*Driopea schmidi* Breuning, 1972c (1971): 418.

HT: Himalaya, Kumaon, Pauri Garhwal, Tarsali, 6.V.1958, 1900-2100m [F. Schmid].

*Eczemotes saintaignani* Breuning, 1982: 16.

PT: Papouasie, archipel de la Louisiade, île Saint-Aignan, Meek coll., VIII-XI.1897; ?PT: [St Aignan, VIII to XI.97, Meek].

*Elongatohomelix mortoni* Breuning, 1967a: 29.

HT: ♂, Sumatra, Baros, ex coll. W. Morton.

*Enicodes kaszabi* Breuning, 1978a: 23.

PT: New-Caledonie, I. Lifou, Bjengen, 21.II.1977, leg. Dr J. Balogh [22.II.1977]; ?PT: [New-Caledonie, I. Lifou, Ouaméne, 22.II.1977, leg. Dr J. Balogh].

*Entelopes fuscotarsalis* Breuning, 1954a: 480.

?PT: [Bornéo, Matang RD., 5.II.1915]; ?PT: [idem, mais 20.I.16].



- Entelopes griseipennis* Breuning, 1954a: 479.  
2 ?PT: [Bornéo occi, Pontianak].
- Entelopes jonoptera sumatrana* Breuning, 1950b: 15.  
2 ?PT: [Sumatra].
- Entelopes subsimilis* Breuning, 1968a: 37.  
?PT: [B. Van Heua, 30.IV.65].
- Epaphra minor* Heller, 1934: 283.  
ST: Luzon, Prov. Laguna, prope Paete, F. C. Hadden leg., ex coll. Dr Reinh. Meyer, Darmstadt [Pangil, Laguna, P.I.].
- Epectasis hiekei* Breuning, 1974e: 157.  
PT: Mexico, Cerro de Plumas.
- Epepeotes spinosoides* Breuning, 1980e: 170.  
?HT: Ile Mindanao, coll. Lumawig, MNHN [ill., Wallace].
- Eryssamena besucheti* Breuning, 1972c (1971): 417.  
HT: Assam, Kameng, Talung Dzong, 12.V.1961, 2100m [Himalaya, F. Schmid].
- Eryssamena schmidi* Breuning, 1972c (1971): 417.  
HT: Himalaya, Kumaon, Pauri Garhwal, Pana, 10.VIII.1958, 2500m [F. Schmid].
- Essisus vivesi* Breuning, 1978c: 135.  
?PT: [Australie, Brookfield, J. Sedlacek leg., XII.76].
- Eunidia albosignata* Breuning, 1972a: 281.  
?PT: [Zaïre, Mambasa, Ituri].
- Eunidia boafai* Breuning, 1978d: 94.  
?PT: [Ghana, Tafo, IX-X.1967, Boafai].
- Eunidia flavoapicata tchadensis* Lepesme & Breuning, 1955: 854.  
2 PT: Aïr, Oued Eir, 14.VIII.1949.
- Eunidia fulvescens* Breuning, 1976b: 737.  
HT: Kenya, Neu-Moschi, 800m, IV.1912; 2 PT: idem.
- Eunidia nigroapicaloides* Breuning, 1976a: 207.  
2 ?PT: [Chota-Nagpore, Nowatoli, V-VI.1896, R.P. Cardon].
- Eunidia pseudosenilis* Breuning, 1970c (1971): 664.  
?PT: [Botswana, Serowe, Swaneng Hill, 20.XI.79, U.V., Forchhammer leg., n° 5123].
- Eunidia vagevittipennis* Breuning, 1981b: 56.  
?PT: [ill., Iringa D.O.A., coll. Plasoo].
- Eunidia varicolor* Breuning, 1971c: 381.  
PT: Ghana, Kumasi.
- Exocentrus assamensis* Breuning, 1972c (1971): 419.  
HT: Assam, Kameng, Nyukmadong, 2.VIII.1961, 2000-2400m [Himalaya, F. Schmid].

*Exocentrus celebicus* Breuning, 1956c: 249.

?HT: Célèbes, Kandelari, IV.1874, leg. O. Beccari, MCSN [Célèbes].

*Exocentrus fuscipes* Breuning, 1981a: 51.

PT: Kenya, Arusha, XI.1961, P.P. De Moor.

*Exocentrus holonigra* Breuning, 1972c (1971): 419.

HT: Assam, But, 23.VI.1961, 1750m [Himalaya, F. Schmid].

*Exocentrus laosicus* Breuning, 1963b: 47.

?PT: [Laos, Wong Tevada, Vientiane, 9.X.62, Coll. Rondon]; ?PT: [id. mais 16.X.62].

*Exocentrus misellomimus* Breuning, 1963b: 48.

?PT: [Laos, Wong Tevada, Vientiane, 18.X.62, Coll. Rondon / M]; ?PT: [id. mais 28.X.62].

*Exocentrus paravariegatus* Breuning, 1981a: 51.

?PT: [Tvl, Rustenburg, 1-2.XII.1957, D.W. Rorke].

*Exocentrus parvus* Holzschuh, 1984: 157.

PT: Népal, Arun-Valley, Dhankuta, Khantbari-Arunthan, 1100-1300m, 29.V.1938, leg. Holzschuh.

*Exocentrus ravillus* Holzschuh, 1984: 158.

PT: E. Népal, Arun-Valley, Dhankuta, Lamobagar, 1400m, 8-14.VI.1983, C. Holzschuh.

*Exocentrus rondoni* Breuning, 1963b: 47.

?PT: [Laos, Phon Tion, 10.VI.63, Coll. J.A. Rondon]; ?PT: [id. mais 22.VI.63].

*Exocentrus unialbovittatus* Breuning, 1969a: 36.

HT: Congo, Haut-Katanga, Panda, IV.1929, leg. J. Romieux.

*Exocentrus vitticollis* Breuning, 1974c: 418.

PT: Ethiopie, Prov. Kaffa, Mui, 700m, 10.IV.1972, leg. R.O.S. Clarke [ref. 0550 N / 3545 E].

*Falsepilysta rosselli* Breuning, 1982: 10.

2 ?PT: [Rossel Is., I-III.98, Meek].

*Frea mussardi* Breuning, 1969a: 36.

HT, PT (allotype): ♂, Côte-d'Ivoire, Adiopé, VII.1948, leg. Mussard. (L'allotype manque).

*Frea taverniersi* Breuning, 1973a: 96. (orthographié *tavernieri* dans la collection.)

?PT: [Zaïre, Kisangani].

*Glenea assamana* Breuning, 1967a: 34.

HT: ♂, Assam, leg. Schmid [Khasi-Faintia Hills, Mawpran, 900-2000ft]; 3 PT: idem.

*Glenea bedoci mussardi* Breuning, 1967a: 35.

HT: ♂, N.E. Assam, 23.V.1961, leg. Schmid [Kameng, Amatulla, 1300-2000ft].

*Glenea besucheti* Breuning, 1974a: 74.

HT: ♀, Philippines, Ile Luzon, Manila, Calo, V.1928, W. Parsons.

*Glenea bougainvillei* Breuning, 1958b: 315.

HT: Bougainv.

- Glenea mira bernardii* Breuning, 1977a: 298.  
PT: Gabon, mont Bengue, 6.X.1967, leg. G. Bernardi.
- Glenea nitidicollis rufina* Breuning, 1976b: 740.  
HT: Indonésie.
- Glenea perakensis* Breuning, 1956b: 126 (Breuning, 1956d: 699).  
3 ?PT: [Malaisie, Perak, Gounong Boubou, 1100m, W. Doherty].
- Glenea peregoi sumatrensis* Breuning, 1976b: 740.  
HT: Sumatra, Benkoelen, Moeara Tenam.
- Glenea pici schmidi* Breuning, 1967a: 35.  
HT: ♂, N.E. Assam, 23.V.1961, leg. Schmid [Kameng, Amatulla, 1300-2000ft].
- Glenea pseudogiraffa taverniersi* Breuning, 1974d: 777.  
?PT: [Ht Zaïre, Kisangani].
- Glenida cyaneofasciata* Breuning, 1952: 116.  
?PT: [British Bootang, J. Durel].
- Gnoma blanchardi* Breuning, 1945 : 533.  
?PT: [St Aignan, VIII-IX.97, Meek].
- Gnoma? plumigera* Westwood, 1848: 11.  
HT: Java, coll. A. Melly [Himilaya Mount, Melly].
- Goephanes ruficornis* Breuning, 1964a: 97.  
HT: Madagascar, Diego-Suarez [Coll. G. Junod].
- Hoplorana mussardi* Breuning, 1958 (1957): 177.  
HT: ♂, Madagascar Est, Antalaha, coll. Mussard [XI.56].
- Hoplothrix paramicator* Breuning, 1966c: 14.  
HT: Inde, Manipur, 28.VIII.1960, leg. Schmid, coll. Mussard [Khaozang, 3750ft].
- Hyagnis indicus* Breuning, 1969a: 35.  
HT: Inde, Madumalai, 19.II., voyage Carl et Escher.
- Hyllisia suturaloides* Breuning, 1981a: 44.  
PT: Ost Transvaal, Trichardtsdal, 25.XI.1972, H.J. Botha.
- Inermoparmena besucheti* Breuning, 1971b: 304.  
HT: Ceylan Central, Horton Plains, 2100m, 15.II.1970, tamisages en forêt [Mussard, Besuchet et Löbl]; 4 PT: idem; 3 PT: Hakgala, versant NE, 1700-1800m, 28.I.1970, tamisages en forêt; 3 PT: Pidurutalagala, versant SO, 2200m, tamisages en forêt.
- Jordanoleiopus mirei* Breuning, 1977a: 294.  
PT: Cameroun, Nkom (Saa), 24.IX.1971, leg. Ph. de Miré.

*Lasiocercis hovanoides* Breuning, 1964a: 96.

HT: ♀, Madagascar, Diego Suarez, ex. coll. Junod.

*Lasiocercis truncatoides* Breuning, 1975: 258.

2 PT: Madagascar Centre, Adringitra Est, Anjavidilava, 2000m, FDSMP, sur *Cussonia* sp. (Araliacées), 18.XII-15.I.1971.

*Linda annamensis* Breuning, 1954a: 556.

?HT: ♀, Annam, Caleu, ZMUH [Annam, Caleu].

*Linda assamensis* Breuning, 1954a: 555.

?PT: [Assam].

*Linda bimaculicollis* Breuning, 1954a: 558.

?PT: [Assam, rég. de Shillong]; ?PT: [Assam, Khasi Hills].

*Linda javaensis* Breuning, 1954a: 557.

HT: ♀, Java.

*Linda tonkinensis* Breuning, 1959b: 172.

?PT: [Tonkin, Mts Mauson, Fruhstorfer]; ?PT: [Tonkin, Montes Mauson, 2-3000', IV-V., H. Fruhstorfer].

*Mahenes demelti* Breuning, 1980d: 50.

HT: Iles Seychelles, Beau Vallon, VII.1978, leg. C.V. Demelt [Mahé].

*Mallosia imperatrix kurdistan* Breuning, 1970d: 30.

HT: ♂, Kurdistan.

*Mecas albovitticollis* Breuning, 1955c: 146.

?PT: [Mexico].

*Megalofrea transvaaliensis* Breuning, 1981a: 48.

PT: Transvaal, Warmbaths, I.1917, G. Kobrow.

*Menesia bicoloricornis* Breuning, 1963a: 6.

HT: ♀, Sumatra, Bukoelen, Moeara-Tenam, leg. M.E. Walsh [1935]; PT: idem.

*Menesia gleneoides* Breuning, 1965c: 39.

?PT: [Laos, Parkading, 27.VI.64, Coll. Rondon]; ?PT: [Parkading, 20.V.63].

*Menesia laosensis* Breuning, 1963c: 20.

?PT: [Loc Wa, Km 17, Pa Sang, Vientiane, 1.IV.62]; ?PT: [Km 17, Pa Sang, Vientiane, 31.V.62].

*Menesia latevittata* Breuning, 1954a: 425.

2 ?PT: [Borneo, Sandakan, Baker].

*Menesia longitarsis* Breuning, 1954a: 417.

2 PT: Borneo, Sandakan [Baker].

*Menesia ochreicollis* Breuning, 1954a: 422.

?PT: [Bornéo, Sandakan, Baker].

*Menesia octoguttata* Breuning, 1954a: 411.

HT: ♀, China, Provinz Szetschuan, Tatsienlu, leg. Stötzner; ?PT: [Su-Tchuen, Mo-Sy-Mien].



*Menesia sexvittata* Breuning, 1962b: 14.

HT: Java, Malang; ?PT: [Java occ., Mt Gedeh].

*Menesia subguttata* Breuning, 1954a: 414.

HT: ♀, Borneo, Sandakan.

*Menesida flavipennis* Breuning, 1954a: 446.

?PT: [Sumatra, Medan].

*Menesida rufula* Breuning, 1954a: 448.

HT: ♂, Java, Pengalengan, 1300m, leg. H. Fruhstorfer; ?PT: [Java, Preanger, Mts Djampang].

*Micromandibularia rufa* Breuning, 1954a: 528.

HT: ♀, Indien, Manipur.

*Microsomatidia reticulata* Sudre, 2000: 80.

HT: New Caledonia, Mt. Koghi, prim. for., 400-500m, litter, 18-19.X.1998, I. Löbl; PT: idem; PT: New Caledonia, Col de Mouirange, nr Table d'Union, 260m, litter, 16.IX.1997, I. Löbl.

*Microrhodopis albovittata* Breuning, 1976b: 740.

HT: Malaisie, Frasers Hill, 17-30.XI.1974, leg. P. Pfanner.

*Mimeryssamena besucheti* Breuning, 1972c (1971): 418.

HT: Himalaya, Kumaon, Pauri Garhwal, Mandoli, 1.VI.1958, 2300m [F. Schmid].

*Mimeuseboides exacavatipennis* Breuning, 1967a: 33.

HT: N.E. Assam, 13.V.1961, leg. Schmid [Kameng, Jhum La, 7800ft].

*Mimocrossotus rhodesianus* Breuning, 1972a: 283.

?PT: [Rhodésie, Salisbury, 17.X.1971].

*Mimomorpha flavopunctata* Breuning, 1980e: 178.

2 ?PT: [Insel Mindanao].

*Mimophaeopate assamensis* Breuning, 1967a: 31.

HT: N.E. Assam, 23.V.1961, leg. Schmid [Kameng, Amatulla, 1300-2000ft, 23.V.61].

*Mimostedes decellei* Breuning, 1968b: 347.

PT: Côte d'Ivoire, Bingerville, 16.II.1964, J. Decelle; PT: id. mais 23.II.1964; PT: id. mais 1-8.III.1964.

*Mispila tonkinensis* Breuning, 1964a: 96.

HT: Tonkin, Langson, Ban-danh [E. Autran, 1898 / P. de Borre].

*Moechothypa formosana* Breuning, 1974b: 372.

HT: Formose, Puli Taitung, V-VI.71, leg. K.H. Chen.

*Monochamus densepunctatus* Breuning, 1980e: 173.

?PT: [Insel Mindanao].

*Monochamus kinabaluensis* Hüdepohl, 1996: 5.

HT: ♀, Ost-Malaysia, Sabah, Mt Kinabalu, 1500m, 30.VI.1987, Burckhardt, Löbl leg. [30.IV.1987].

*Monochamus marmoratipennis* Breuning, 1974a: 74.

HT: Côte d'Ivoire, Sassandra, I.1950, R. Mussard.

*Monochamus subtrangularis* Breuning, 1972c (1971): 416.

HT: Assam, Kameng, Bhairabkunda, 19.V.1961, 200-300m [Himalaya, F. Schmid].

*Monohammus bifasciatus* Westwood, 1848: 59.

HT: Himalayas, coll. A. Melly [Saunders Harrington].

*Monohammus punctulatus* Westwood, 1848: 12.

HT: Himalayas, coll. A. Melly.

*Monohammus westwoodii* Westwood, 1848: 12.

HT: Himalayas, coll. A. Melly.

*Morimopsis assamensis* Breuning, 1966c: 14.

HT: ♂, Assam, North East Frontier Agency, Kaliktang, 14.V.1961, leg. Dr F. Schmid, coll. Mussard; PT (allotype): ♀, dito, Talung-Dzong, 2300m alt., 4.VI.1961, Dr Schmid, dtlo., coll. Mussard.

*Morimopsis mussardi* Breuning, 1966c: 14.

HT: ♂, Assam, North-East Frontier Agency, Dirang Dzong, 1800m alt., 21.VII.1961, leg. Dr Schmid, coll. Mussard.

*Mussardia griseoplagiata* Breuning, 1959a: 5.

HT: Congo belge, Uélé, coll. Mussard [Bili 1952, Verbeke].

*Mutatocoptops lumawigi* Breuning, 1980e: 157.

?PT: [Insel Mindanao].

*Nemaschema flavovittatum* Breuning, 1976b: 739.

HT: Nouvelle Calédonie, Sana Pirogue, 4.XII.1952.

*Nemaschema ochreovittatum* Breuning, 1978a: 23.

PT : Nouvelle Calédonie, Mont Rembai, 19-21.I.1977, leg. Dr J. Balogh.

*Neodorcadion altaicum* Suvorov, 1909: 89.

ST: Altai, village Causaque de Bolschenarim, 08.VI.1906. rec. A.G. Jacobson [Semipalatinskaya obl. Altay Irtysh ct. Volsheparym. 8.VI.1906. A.Yakobson (en cyrillique)].

*Neonitocris rhodesica* Breuning, 1950c: 29.

?PT: [Kafakumba, XI.1933, F.G. Overlaet].

*Neoserixia pulchra* Schwarzer, 1925: 148.

ST: Formose, Kankau, V.1912, H. Sauter [Koshun].

*Nipphonatossa mussardi* Breuning, 1967a: 29.

HT: ♀, Assam, Cachar District, 9.V.1960, leg. Schmid [Bandarkhal, 500ft, 9.V.60, Schmid].

*Niphoparmena basilewskyi* Breuning, 1960c: 336.

PT: Tanganika.

*Nitocris funesta* Fåhræus, 1872: 57.

?PT: [Caffraria].

*Nitocris maculicollis* Perringuey, 1888: 184.

ST: ill., Stalbord, 11.87 / ♀.

*Nitocris sanguinalis* Kolbe, 1893 : 77.

ST: Togo, Bismarckburg, VI.1891.

*Nonyma allardi* Breuning, 1972a: 284.

HT: Zaïre, Ituri, Mambasa.

*Nonyma nigeriae* Breuning, 1978d: 108.

?PT: [Nigeria, Ibadan, 15.I.1963, D.C. Eidt].

*Nupserha schmidi* Breuning, 1966c: 16.

HT: ♀, North-East Assam, Biloda, 2000m alt., VI.1961, leg. Schmid, coll. Mussard [Assam- Kameng, Yhum-La, 16.IX.61].

*Nupserha similis* Breuning, 1978d: 113.

?PT: [Tanganica, W. Usambara Mts, 2000m, Maganta, III.1962].

*Nupserha tanganjicae* Breuning, 1978d: 112.

PT: Tanzanie, Mts Rungwe, 2600m, XI.1962 [5-10.XI.62]; 3 ?PT: [idem].

*Nupserha tanganjicae uluguruensis* Breuning, 1978d: 113.

2 ?PT: [Tanganyika, Uluguru Mts, 1500-1800m].

*Nupserha ugandensis* Breuning, 1978d: 111.

?PT: [Uganda, Entebbe, II-VII.1972, Exp. H. Falke].

*Oberea andamana* Breuning, 1962a: 152.

?PT: [Andaman Islands].

*Oberea andamanica* Breuning, 1962a: 152.

2 PT: Iles Andamanes.

*Oberea angolana* Breuning, 1961b: 62.

HT: ♂, Angola, Coconda [Bailundo].

*Oberea angolensis* Breuning, 1950d: 273.

2 ?PT: [Angola, Bailundo].

*Oberea annamensis* Breuning, 1969a: 37.

HT: ♂, Annam [Coll. Junod]; 2 ?PT: [Annam].

*Oberea anterufa* Breuning, 1962a: 142.

HT: ♀, Philippines, Ile Dalapiri.

*Oberea apicenigrata* Breuning, 1962a: 170.

?PT: [Laos, Yuang-Prabang].

- Oberea artocarpī andamanensis* Breuning, 1962a: 147.  
?PT: [And. Is.].
- Oberea aterrima* Breuning, 1961b: 100.  
HT: ♂, Célèbes, Tombugu [H. Kuhn, '95].
- Oberea auriventris* Breuning, 1961b: 118.  
2 PT: Borneo, Sandakan, Baker.
- Oberea baliana* Breuning, 1961b: 117.  
HT: ♀, Ile Bali, III-IV.1896, leg. Doherty.
- Oberea banguyensis* Breuning, 1950b: 25.  
?PT: [Nord Borneo, Banguy]; ?PT: [Banguy I., Staudinger].
- Oberea batoensis nigrata* Breuning, 1961b: 101.  
PT: Sumatra, Medan; ?PT: [idem].
- Oberea bicoloripennis* Breuning, 1950c: 43.  
?PT: [Zambesi, Boroma].
- Oberea bimaculicollis* Breuning, 1962a: 191.  
HT: ♂, Cambodge.
- Oberea bisbimaculata* Breuning, 1962a: 190.  
HT: ♀, Tonkin, Chapa.
- Oberea bisbipunctata discoreducta* Breuning, 1969a: 37.  
HT: ♀, Annam [coll. Junod].
- Oberea bisbipunctulata* Breuning, 1962a: 191.  
PT: British Bootang, 1898, L. Durel; PT: idem, mais Padong, 1914.
- Oberea bootangensis* Breuning, 1962a: 177.  
HT: ♂, Bootan [L. Durel]; PT: ♀: idem [Maria Basti].
- Oberea callosicollis* Breuning, 1962a: 171.  
?PT: [Bengal, Chapra]; ?PT: [Tenasserim, Tandong, 4000', Mai, Fruhstorfer leg.].
- Oberea cariniscapus* Breuning, 1956g: 23.  
?HT: Java, IRSN [Malacca, Perak].
- Oberea circumscutellaris* Breuning, 1961b: 96.  
HT: ♂, Ile Engano.
- Oberea davaoensis* Breuning, 1961b: 139.  
?PT: [Ilayavo □□□, Birlig / Philipp., Sumpei]; ?PT: [Philipp., Sumpei].
- Oberea densepilosa* Breuning, 1955a: 76.  
?PT: [Abyssinia, Harrar].
- Oberea densepunctipennis* Breuning, 1962a: 144.  
?PT: [Philippinen, Luzon, Prov. Laguna].
- Oberea elongaticollis* Breuning, 1961b: 140.  
?PT: [Mindanao, Davao].
- Oberea erythrocephala palawanicola* Breuning, 1964b: 6.  
HT: ♂, Iles Palawan; ?PT: [Mindoro].
- Oberea flava* Breuning, 1961b: 122.  
HT: ♂, Célèbes, Toli-Toli; ?PT: [S. Celebes, Bua-Kraeng, 5000', II.1896, H. Fruhstorfer].
- Oberea flavescens* Breuning, 1947c (1946): 146.  
HT: ♀, Chine, province Sétchouen, Tatsienlou.



- Oberea flavoantennalis* Breuning, 1961b: 125.  
HT: ♀, Célèbes, Tomboeogoe.
- Oberea flavoantennata* Breuning, 1962a: 146.  
?PT: [Philippinen, Luzon?, Malacia?].
- Oberea florensis* Breuning, 1961b: 130.  
HT: ♀, South Flores, X.1896, leg. Everett; PT: ♂, idem.
- Oberea floresica* Breuning, 1961b: 131.  
?PT: [Flores].
- Oberea fulviceps* Breuning, 1950c: 38.  
?PT: [Cameroons, Bitye Ja River]; ?PT: [Kamerun].
- Oberea fuscicollis* Breuning, 1961b: 138.  
2 ?PT: [Philippinen, Mindanao, Surigao].
- Oberea fuscipennis perakensis* Breuning, 1962a: 179.  
?PT: [Annam, Quinhone]; ?PT: [Tonkin, Montes Manson, IV-V., 2-3000', H. Fruhstorfer].
- Oberea gabunensis* Breuning, 1950c: 39.  
2 ?PT: [Gabon, Bas Ogoué].
- Oberea griseopennis* Schwarzer, 1925: 154.  
ST: Formose, Kankau, Koshun, H. Sauter [V.1912].
- Oberea grossepunctata* Breuning, 1947c (1946): 145.  
HT: ♀, Chine, prov. du Yunnan, Fleuve Soling-ho [Vallis flumin.]; ?PT: [Chin., Yunnan, F.I. Solingho].
- Oberea himalayana* Breuning, 1972c (1971): 420.  
HT: ♀, Assam, Kameng, But, 23.VI.1961, 1750m [Himalaya, Schmid].
- Oberea holatripennis* Breuning, 1982: 29.  
?PT: [Pekin / Ex. Musaeo, Arm. David, 1900].
- Oberea holonigra* Breuning, 1961b: 97.  
HT: ♂, Ile Engano.
- Oberea infranigra* Breuning, 1962a: 181.  
HT: ♀, Cambodge.
- Oberea javana* Breuning, 1961b: 105.  
HT: ♂, Java, Ganung, Tangkuban Prahū [1000-1800m, V.1933].
- Oberea javanicola* Breuning, 1950b: 28.  
?PT: [Java mérid., 1500', 1891, H. Fruhstorfer]; ?PT: pas d'étiquette de localité.
- Oberea kanarensis* Breuning, 1950b: 28.  
?HT: Inde, Kanara, IRSN [C.P. Ceylon, Pundaloya]; ?PT: [N. Kanara, T.R. Bell]; ?PT: [Kanara].
- Oberea kandyana* Breuning, 1962a: 153.  
PT: Ceylan, Kandy; ?PT: [W.P. Ceylon, Henaralgada, Bot. Gards].
- Oberea keyensis* Breuning, 1961b: 128.  
2 ?PT: [Little Kei., H. Kühn].
- Oberea kunbirensis* Breuning, 1953: 37.  
?PT: [India, Kunbir].
- Oberea lepesmei* Breuning, 1956d: 701.  
?PT: [Côte d'Ivoire, Dirubalu].

- Oberea lepesmiana* Breuning, 1956d: 700.  
 ?PT: [Malay Ar., Xulla-Mangoli, X-XI, Doherty]; ?PT: [Sula Mangoli, X-XI, Doherty].
- Oberea luluensis* Breuning, 1950c: 40.  
 ?PT: [Cameroons, Bitye Ja River, 3000ft].
- Oberea lutea nilghirica* Breuning, 1955a: 77.  
 2 PT: Inde, Nilghiri Hills.
- Oberea manipurensis* Breuning, 1961b: 98.  
 HT: ♂, Inde, Manipur; PT: idem.
- Oberea matangensis* Breuning, 1962a: 179.  
 ?PT: [Borneo, Baker].
- Oberea medioflavoantennalis* Breuning, 1961b: 124.  
 HT: ♀, Célèbes, Tomboegos.
- Oberea mediofusciventris* Breuning, 1962a: 171.  
 HT: ♂, South East Borneo.
- Oberea mentaweiensis* Breuning, 1961b: 108.  
 HT: ♂, Iles Mentawei, Ile Sipora, VI.1924, leg. Karny.
- Oberea meridionalis* Breuning, 1961b: 71.  
 ?PT: [Cap. B. Spei].
- Oberea nigerrima* Breuning, 1950b: 25.  
 ?PT: [Java occident., Pengalengau, 4000, 1893, H. Fruhstorfer]; ?PT: pas d'étiquette de localité.
- Oberea nigrescens* Breuning, 1961b: 110.  
 PT: Kuching, X.1906; ?PT: [idem mais V.1907, J.H].
- Oberea nigripennis* Breuning, 1950c: 38.  
 PT: Congo B., Katanga, riv. Kawa; ?PT: [Gabon, Bas Ogoué].
- Oberea nigripennis camerunica* Breuning, 1961b: 92.  
 ?HT: ♀, Cameroun, Ja River, Bitye, ex. coll. Oberthür, MNHN [Cameroun, Batanga]; ?PT: [Cameroons, Bitye Ja River, 3000ft.].
- Oberea nigripes* Breuning, 1950b: 26.  
 ?PT: [Java, Soekaboemi, Coll. Le Moults]; ?PT: [Java occid., Sukabumi, 2000', 1893, Fruhstorfer].
- Oberea nigroapiciventris* Breuning, 1962a: 167.  
 ?PT: [Borneo mer.].
- Oberea nigrobasipennis* Breuning, 1950c: 38.  
 2 PT: Congo belge, Eala.
- Oberea nigrofemoralis* Breuning, 1950c: 39.  
 ?PT: [Cameroons, Bitye Ja River, 3000ft]; ?PT: [Kamerun, Mukoja, Farm].
- Oberea nigrolateralis* Breuning, 1950b: 27.  
 2 PT: Java, Soekaboemi.
- Oberea nigrolineatipennis* Breuning, 1970e: 172.  
 ?PT: [Katanga, Zilo, IV.69].
- Oberea nyassana* Breuning, 1950b: 30.  
 2 ?PT: [Mozambique, Zambesie].

- Oberea occidentalis* Lepesme & Breuning, 1953: 104.  
?PT: [Kumassi, Newberry].
- Oberea octava kuchingensis* Breuning, 1962a: 197.  
?PT: [Bornéo occ.]; ?PT: [Kuching, II.1907, H.F.].
- Oberea opacipennis* Breuning, 1961b: 132.  
HT: ♀, Ile Sumbawa; PT: idem.
- Oberea ornativentris* Breuning, 1961b: 70.  
HT: ♀, Rhodésie; PT: ♀, Kenya.
- Oberea palawanensis* Breuning, 1961b: 115.  
?PT: [N. Palawan, Binuluan, XI-XII.1913, leg. G.Boettcher].
- Oberea parteflavoantennalis* Breuning, 1961b: 101.  
HT: ♂, Bornéo, Sandakan, leg. Baker.
- Oberea partenigricollis* Breuning, 1961b: 137.  
2 ?PT: [Philippin., Bilaran].
- Oberea pedemontana koniensis* Breuning, 1962a: 218.  
HT: ♀, Anatolie, Eregli [Türkei, Konia, 1050m, 6.VII.1952, Eregli, leg. Erich Schmidt].
- Oberea philippinensis* Breuning, 1961b: 137.  
PT: Philippines, Ile Mindanao oriental; ?PT: [Mind.].
- Oberea pontianakensis* Breuning, 1962a: 176.  
HT: ♂, Bornéo, Pontianak; ?PT: [Borneo, Pontianak].
- Oberea pseudobalineae* Breuning, 1955a: 76.  
?PT: [Luzon, Manille]; ?PT: [Rio Baubo, 64].
- Oberea pseudolacana* Breuning, 1956d: 700.  
2 ?PT: [N. Borneo, Kina-Balu].
- Oberea pseudonigrocincta* Breuning, 1961b: 69.  
HT: ♂, Erithrée.
- Oberea pseudopascoei* Breuning, 1950c: 41.  
2 ?PT: [Gabon, Bas Ozooné].
- Oberea pseudoposticata* Breuning, 1962a: 165.  
HT: ♂, Tenasserim, Meetan, IV.1887.
- Oberea puncticollis* Breuning, 1962a: 146.  
?PT: [Philippinen, Luzon, Prov. Apayao].
- Oberea pupillatoides* Breuning, 1947c (1946): 145.  
HT: ♀, Chine, province du Chansi [26.VI.16].
- Oberea resslī* Demelt, 1963a: 150.  
3 PT: Asia minor sept., Kizilcahamam [62].
- Oberea ruficeps muchei* Breuning, 1981c: 26.  
HT: Pamir-Alai, Tadshikistan, environs de Siddi, 2000-2500m, I-VII.1980, leg. Heinz Muche; 2 PT: idem, MHNG. (*Les trois exemplaires n'ont pas été retrouvés*).
- Oberea rufiniventris* Breuning, 1968a: 41.  
?PT: [Pakkading, 15.IV.66]; ?PT: [Bibu Ena, 15.IV.65].
- Oberea rufoantennalis* Breuning, 1962a: 143.  
?PT: pas d'étiquette de localité.

- Oberea rufosternalis* Breuning, 1961b: 95.  
PT: Yunnan, Peyentsin; ?PT: [Sud Yunnan, Tche-Ping-Tcheou].
- Oberea sanghirica* Breuning, 1961b: 100.  
HT: ♀, Sanghir, Taroena, III-IV, leg. Doherty [2000].
- Oberea semifuscipennis* Breuning, 1950b: 29.  
?PT: [Maïssour, Shimoga]; ?PT: [Nilgiri Hills, H.L. Audrewes, ill., Teppenkadu, V.11, 2500'].
- Oberea semirubra* Breuning, 1962a: 148.  
HT: ♂, Cochinchine, Cap St Jacques [Baria].
- Oberea senegalensis* Breuning, 1961b: 66.  
?PT: [Sénégal].
- Oberea shibatai* Hayashi, 1962: 40.  
PT: Amami-Oshima, Naze, 29.IV.1961, Y. Susumu leg.
- Oberea shirahatai* Ohbayashi, 1956: 762.  
2 PT: Nord Honshiu, Sakata, Yamagata Pref., 9.VII.1952, leg. K. Shirahata.
- Oberea silhetica* Breuning, 1961b: 117.  
HT: ♀, Inde, Silhet, Chandkiva.
- Oberea sobosana* Ohbayashi, 1956: 761.  
PT: ♂, Kiushiu, Mt Sobo, Oita Pref., Kyûshû, Mt Sobo, Oita, 23-26.VII.1952, Y. Miyake leg. [26.VII.1952].
- Oberea subabdominalis* Breuning, 1962a: 166.  
2 ?PT: [Birmanie, Theinzek, 1913, P. Loizeau / 167].
- Oberea subbasalis* Breuning, 1950c: 42.  
?PT: [P. Natal].
- Oberea subferruginea* Breuning, 1965a: 52.  
2 ?PT: [Kongsédone, 30.IV.65].
- Oberea subneavei* Breuning, 1961b: 75.  
HT: ♂, Cameroun, Mukonje Farm; ?PT: [Cameroun, Yaoudé].
- Oberea subnigrocincta* Breuning, 1950c: 42.  
2 ?PT: [Cameroons, Bitye Ja River, 3000ft].
- Oberea subsericea* Breuning, 1962a: 180.  
HT: ♀, Chine, prov. Kwei-chow, Nanning.
- Oberea subsuturalis* Breuning, 1954b: 19.  
?PT: [Kenya, Ihatha].
- Oberea subtereaurea* Breuning, 1961b: 118.  
HT: ♂, Bornéo, Sandakan, leg. Baker; ?PT: [Bornéo occ., Riv. Sambey près Noabang / 1897, J.B. Ledru].
- Oberea subvaricornis* Breuning, 1961b: 73.  
PT: Durban, XII.03; PT: Durban, Congella, G.F. Leigh.
- Oberea subviparina* Breuning, 1960a: 15.  
?HT: Philippines, Mindanao, Surigao, Mus. Dresde [Mindanao, Surigao].
- Oberea sumbana* Breuning, 1961b: 131.  
PT: Waingapoe, 96, Everett; ?PT: [Sumba].
- Oberea sumbawana* Breuning, 1961b: 132.  
HT: ♀, Ile Sumbawa.



*Oberea sumbawanica* Breuning, 1961b: 133.

HT: ♂, Ile Sumbawa.

*Oberea sumbawensis* Breuning, 1961b: 131.

HT: ♂, Ile Sumbawa, Mt. Harunasa; ?PT: [Insel Sumbawa].

*Oberea taihokuensis* Breuning, 1962a: 168.

HT: ♀, Formose, Taihoku [20.IV.1932, Col. M. Chujo].

*Oberea tatsienlui* Breuning, 1947c (1946): 145.

HT: ♂, Chine, prov. de Sétchouen, Tastsienlou [Tatsienlu Dsaschi / Bergschluchten, Em. Reitter].

*Oberea tenggeriana* Breuning, 1963a: 10.

HT: ♀, Java, Mts Tengger, leg. Walsh.

*Oberea travancorensis* Breuning, 1962a: 151.

HT: ♂, Inde, Travancore.

*Oberea tricoloricornis* Breuning, 1961c: 43.

HT: ♂, Cameroun, Bitye, 1000m [3000ft].

*Oberea trigonalis* Breuning, 1950c: 42.

?PT: [Transvaal, Hartmann]; ?PT: [ill., Zouberi].

*Oberea truncatipennis* Breuning, 1962a: 170.

HT: ♂, South East Borneo.

*Oberea unimaculicollis* Breuning, 1962a: 194.

HT: ♀, Sumatra, Medan.

*Oberea wittei* Breuning, 1954c: 78.

2 PT: ♀, Lusinga, 1760m, 28.XI-17.XII.1947 [Congo].

*Oberea yunnanensis* Breuning, 1947c (1946): 147.

HT: ♀, Chine, province Yunnan, Fleuve Soling-ho; ?PT: [China, Prov. Yunnan, Vattis flumin, Soling-ho].

*Obereopsis coimbatorana* Breuning, 1974b: 374.

HT: Inde, Madras, Coimbatore, 500m, XI.1971, leg. T.R.S. Nathan; PT: idem.

*Obereopsis himalayana* Breuning, 1972c (1971): 420.

HT: ♀, Himalaya, Kumaon, Pauri Garhwal, Binaik Chatti, 2.VII.1958, 2150-2250m [F. Schmid]; PT: idem.

*Obereopsis nigriceps nigroabdominalis* Breuning, 1972c (1971): 420.

HT: Sikkim, Yugang, 24.VII.1959, 1750m [Himalaya, F. Schmid].

*Obereopsis paratricollis* Breuning, 1967a: 36.

HT: ♀, N.E. Assam, leg. Schmid [Kameng].

*Obereopsis trinotaticollis* Breuning, 1967a: 36.

HT: ♂, Inde, Manipur, 15.VI.1960, leg. Schmid; PT: idem [Assam, Chingsao, 3800-5400ft].

*Oeax collaris nigromaculatus* Breuning, 1978d: 103.

?PT: [Ghana, Tafo, VI.1969, E.O. Boafo].

*Ossonis modiglianii* Breuning, 1950a: 200.

2 ?PT: [Sumatra, Si-Rambé, XII.90-III.91, E. Modigliani].

*Oxylamia vagemarmorata* Breuning, 1974a: 74.

HT: ♂, Côte d'Ivoire, Sassandra, R. Mussard, I.1950.

*Oxyilia androsensis* Breuning, 1963a: 10.

HT: ♂, Grèce, Ile Andros, 27.IV.1960 [24.IV.60].

*Parabrimus ruficornis* Breuning, 1981a: 46.

PT: Transvaal, Mariepskop, II.1962, N. Leleup.

*Paracloдия besucheti* Breuning, 1974b: 374.

HT: Inde, Kerala, Cardamon Hills, Periyar, 950m, 4.XI.1972, leg. Besuchet, Löbl, Mussard, attiré par les lumières de l'Hôtel Aranya Nivas.

*Paracondyloides flavofasciatus* Breuning, 1978a: 25.

?PT: [Nlle Calédonie, Caavatch, 15.II.1977, leg. Dr J. Balogh].

*Paradystus ceylonicus* Breuning, 1954a: 460.

HT: ♀, Insel Ceylon.

*Paradystus infrarufus* Breuning, 1954a: 460.

HT: ♀, Tenasserim, Tamdong, 1700m, mai, leg. Fruhstorfer.

*Paradystus innotatus* Breuning, 1954a: 459.

?PT: [SO Sumatra, Merang]; ?PT: [Bornéo, Sandakan, Baker].

*Paraglenea latefasciata* Breuning, 1952: 127 (Breuning, 1956d: 697).

?PT: [Tonkin, Chapa, I.VII.1917, Jeanvoine]; ?PT: [Tonkin, Thanh-Moi, 24.VI-II.1917, Jeanvoine].

*Paraglenea transversefasciata* Breuning, 1952: 128.

2 ?PT: [Laos, Lonang-Prahang].

*Parahyllisia indica* Breuning, 1974e: 163.

PT: Indien, Kodaicanal [Indes Orientales, Mts. Kodaicanal, J. Castets].

*Paralamiodorcadion schmidi* Breuning, 1967a: 28.

HT: ♀, Inde, Manipur, 9.VI.1960, leg. Schmid [Assam].

*Paramenesia nigrescens* Breuning, 1966b: 53.

HT: ♂, Tonkin, Monts Mauson, leg. Fruhstorfer [IV-V, 2-3000'].

*Paramimiculus pterolophioides* Breuning, 1964a: 95.

HT: ♂, Lourenço Marques, Makulane, leg. Dr G. Audeoud.

*Paraserixia flava* Breuning, 1954a: 442.

?PT: [Burma].

*Parasermus tonkinensis* Breuning, 1969a: 36.

HT: ♂, Tonkin, ach. Baudet.

*Parazygocera baloghi* Breuning, 1978b: 69.

2 PT: New Caledonie, Mt Mandjello, 17.II.1977, leg. Dr J. Balogh.

*Pareutetrappa nigrimaculata* Breuning, 1952: 138.

?PT: [Tonkin occ., Rég. de Hoa Binh].

*Pareutetrappa olivacea* Breuning, 1952: 138.

HT: ♀, China, Lou-tse-kiang [1901]; ?PT: [Tali-fr, Yunnan, China].

*Parischnolea chiliensis* Breuning, 1980b: 69.

PT: Chili, El Nague, Coquimbo, 10.X.1976, J. Solervicens Rec.

*Phantasis nodulosa* Sudre & Teocchi, 2000: 25.

PT: Abyss., Harrar, coll. Plason / ♀.

*Phelipara assamana* Breuning, 1967a: 31.

HT: Inde, Manipur, 15.IV.1959, leg. Schmid [Assam, Chingsao, 3800-5400ft, 15.VI.60].

*Philotoceraeus descarpentriesi* Breuning, 1975: 265.

2 PT: Madagascar Centre, Adringitra Centre, plateau Andohariana [Soaindrana], 2000-2100m, HFAM 1, 9.XI-10.XII.1970.

*Phlyarus rufoscapus* Breuning, 1976b: 740.

HT: Tonkin, Mts Mauson, 700-1000m, IV-V, leg. H. Fruhstorfer.

*Phryneta margaritifera* Westwood, 1848: 11.

ST: Nepaul, coll. A. Melly [Margaritifera Melly, Westd Or. Enty 5<sup>th</sup> plate].

*Phytoecia achillena* Holzschuh, 1971: 68.

PT: Anatolien, Amanusgebirge, Prov. Adana, Nurdagi gecidi, 1000m-1200m, 13-27.V.1970, leg. C. Holzschuh [800-1300m].

*Phytoecia adusta* Reitter, 1889: 43.

?PT: [Arménien].

*Phytoecia akbesiana* Pic, 1900: 20.

?PT: [Syrie]; ?PT: [ill., Kiril Dag].

*Phytoecia albosuturalis* Breuning, 1947c (1946): 143.

HT: Shi-wan-tsze, Hiu-man-Kiang-keou [Hiu-mou-kiang-keou].

*Phytoecia anteatra* Breuning, 1966b: 53.

HT: Angola, Loanda [Quela, Loanda, Fazenda Luhanga, Prinz Carolath S.G.];

PT: idem.

*Phytoecia apicefuscipennis* Breuning, 1967b: 40.

HT: ♀, Cameroun, Kribi [Cameroun, Batanga].

*Phytoecia argenteosuturalis* Breuning, 1955e: 356.

PT: Upper Sources, Olifants River, Ceres C. P.

*Phytoecia atricollis* Breuning, 1960b: 23.

HT: ♀, Tanganyika, Lindi [D. O. Afr.].

- Phytoecia atripennis* Breuning, 1951: 450.  
HT: ♀, Congo belge, Beni.
- Phytoecia atrohumeralis* Breuning, 1964b: 7.  
HT: ♂, Congo, Elisabethville.
- Phytoecia basilewskyi* Breuning, 1950c: 46.  
?PT: [Tchad, Haut Chari, Fort Sibut, Collection Le Moulst]; ?PT: [idem mais Congo Français].
- Phytoecia bucharica* Breuning, 1943: 101.  
HT: ♂, Boukhara, Tchitchantan [Ost Buchara, Tschitschantan, Nufswald, F. Hauser, 1898]; ?PT: [Ost Buchara, Tschitschantan, Nufswald, F. Hauser, 1898].
- Phytoecia chinensis* Breuning, 1943: 102.  
HT: ♂, Chine, province Péchéli.
- Phytoecia ciliciae* Breuning, 1951: 406.  
HT: ♂, Ciliciae Adana; PT: idem.
- Phytoecia coeruleipennis* Breuning, 1947a (1946): 22.  
HT: ♂, Cachemire, Kulu; PT: ♀, idem.
- Phytoecia coeruleomicans* Breuning, 1947a (1946): 22.  
HT: ♂, Japon, île Hondo, Chiuzenji.
- Phytoecia coerulescens cretensis* Breuning, 1947e: 60.  
HT: île Crète [Kreta, Hag. Dheka, Holtz / 5.III]; ?PT: [Kreta, Iraklion, IV.53].
- Phytoecia comes szetschuanica* Breuning, 1967b: 40.  
HT: ♂, Chine, Prov. de Szetschouan, Tatsienlu.
- Phytoecia forticornis* Breuning, 1947a (1946): 22.  
HT: ♂, Inde Britannique, Cachemire, Kulu; PT: idem; ?PT: [Kashmir, Kulu].
- Phytoecia fuscolateralis* Breuning, 1977b: 297.  
?PT: [Programma litorale 1, 10.XI.71, Trans. A, Ora 18.00, Zona 5, Direz N.].
- Phytoecia grisea* Breuning, 1947a (1946): 21.  
HT: ♀, Inde Britannique, Spiti [Manikar]; PT: ♂, idem [Pulga].
- Phytoecia hispanica* (*hispancia* orthographe originale incorrecte) Breuning, 1951: 364.  
HT: ♀, Espagne, province de Teruel, Montes Universales, V.1949.
- Phytoecia indica* Breuning, 1951: 404.  
HT: ♀, Inde, Coimbatore.
- Phytoecia infranigra* Breuning, 1951: 429.  
HT: ♂, Kenya, Ikutha.
- Phytoecia kashmirica* Breuning, 1943: 101.  
HT: ♂, Cachemire, Koulou [Manali Kulu]; ?PT: [Indes angl., Spiti, Manikarn].
- Phytoecia kukunorensis* Breuning, 1943: 102.  
HT: ♂, Thibet, Koukounor, 3200m [1898, F. Hauser].
- Phytoecia lahoulensis* Breuning, 1951: 359.  
HT: ♂, Kashmir, Lahoul [Kelling / G. Babault, VII.1914]; PT: idem [Gandla].
- Phytoecia lateralis medionigriventris* Breuning, 1961a: 306.  
2 ?PT: [Ouganda, Entebbe].
- Phytoecia latesuturalis* Breuning, 1951: 430.  
?PT: [Tang., Kilimandjaro].



*Phytoecia moreana* Breuning, 1943: 102.

HT: ♂, Morée, Nauplie [Argos, 1935, Maran et Step., Coll. Barton]; ?PT: [Nauplia / Pelopon., Argos, 1935, Maran et Step., Coll. Barton].

*Phytoecia neavei guineana* Breuning, 1951: 428.

?PT: [Togo, Bismarckburg]; ?PT: [W. Africa, Abutshi, R. Niger].

*Phytoecia nigerrima* Breuning, 1947a (1946): 21.

HT: ♀, Japon, île Hondo, Chiuzenji.

*Phytoecia nigroapicalis* Breuning, 1944: 16.

HT: ♂, Irak, Bagdad; ?PT: [Mesopotania, Mosul, V.09, Coll. Hauser].

*Phytoecia nigrofemorata* Breuning, 1947a (1946): 23.

HT: ♂, Inde Britannique, Cachemire, Kulu.

*Phytoecia nigrohumeralis* Breuning, 1950c: 46.

?PT: [Belg. Kongo, Beni].

*Phytoecia nigrovittata* Breuning, 1951: 431.

?PT: [Ubanghi].

*Phytoecia orientis medionigripennis* Breuning, 1961a: 306.

2 ?PT: [ill., Ouganda, M.R□ □ □].

*Phytoecia ornata* Breuning, 1951: 438.

HT: ♂, Angola, Bailundo.

*Phytoecia parvula* Breuning, 1960b: 23.

HT: Algérie, Teniet el haad [Schaumm].

*Phytoecia pilipennis* Reitter, 1895: 161. (note manuscrite de Hüdepohl: «ne peut être un PT»).

?ST: Anatolie Kubischtek, Ordubad, Araxesthal [Armenien, Ordubad].

*Phytoecia pseudocallosa* Breuning, 1962b: 15.

HT: ♀, Angola.

*Phytoecia pseudofervida* Breuning, 1951: 419.

?PT: [Durban, X.1896, J.P. Gregor].

*Phytoecia pseudolateralis* Breuning, 1954c: 82.

?PT: [Congo, Lusinga].

*Phytoecia pseudolatesuturalis* Breuning, 1961c: 44.

HT: ♂, Uganda.

*Phytoecia pseudoneavei* Breuning, 1954c: 80.

?PT: [Congo, Lusinga].

*Phytoecia pseudorientis* Breuning, 1962b: 15.

HT: Uganda, Mt Ruwenzori.

*Phytoecia pseudosomereni* Breuning, 1964a: 102.

HT: ♀, Cameroun, Dsang.

*Phytoecia punctipennis* Breuning, 1947c (1946): 143.

HT: ♂, Chine [Tchenkiang, 21.V.18].

*Phytoecia rufa allardi* Breuning, 1974d: 777.

4 PT: Uganda, Entebbe, VII.1973.

*Phytoecia rufovittipennis* Breuning, 1972c (1971): 419.

HT: ♂, Himalaya, Kumaon, Pauri Garhwal, Gamsali, 11.VII.1958, 3350m [F. Schmid].

*Phytoecia rufulescens* Breuning, 1951: 421.

?PT: [Natal, Malv □ □ □, 1.XI.07]; ?PT: [Natal].

*Phytoecia somereni* Breuning, 1951: 449.

2 ?PT: [Kenya, Ikatha].

*Phytoecia stenostoloides* Breuning, 1943: 101.

HT: ♀, Transbaïkalie, Verchné-Oudinsk.

*Phytoecia subcoeruleata* Breuning, 1951: 410.

HT: ♀, Togo, Bismarckburg; ?PT: [Togoland, 1892-1893, L. Conradt].

*Phytoecia subdorsata* Breuning, 1961d: 256.

?PT: [Congo Belge, Luluabourg].

*Phytoecia suturevittata* Breuning, 1951: 429.

?PT: [E. Africa, Mombas].

*Phytoecia suvorovi* (*suvorovi orthographe originale incorrecte*) Pic, 1905: 38.

2 ST: Caucase [Kaukasus, Olty, E. Koenig / *Phytoecia suworowici* Kög / *Phyt. suvorovi* Pic, det.].

*Phytoecia tenuilinea mateui* Breuning, 1951: 365.

2 PT: Rio de Oro, Mateu.

*Phytoecia vulneris paganettii* Breuning, 1944: 16.

HT: ♂, Italie méridionale, Apulie, San Basilio, Paganetti; ?PT: [Murgien, Grottaglie / Paganetti].

*Planodema albosternalis* Breuning, 1950b: 7 (1956e: 720).

HT: ♂, Congo belge, Elisabethville [XI.1911].

*Prosoplus costatus* Hüdepohl, 1996: 4.

HT: ♀, Ost-Malaysia, Bornéo, Sabah, Mt Kinabalu, 3300m, Panar Laban, IV-V.87, Burckhardt, Löbl leg. [4.V.1987].

*Prosoplus laterialbus* Breuning, 1971a: 2.

2 ?PT: [Nouvelle Guinée, Tifalmin, I.69].

*Prosoplus major* Breuning, 1964a: 96.

HT: Célebès, Makassar, leg. A. Naville [602 Mr, 25].

*Prosoplus rosselli* Breuning, 1982: 16.

PT: Papouasie, archipel de la Louisiade, île Rossel, Meek coll., I-III.1898.

*Prosopocera ferrierei* Breuning, 1950b: 5.

HT: ♂, Congo belge, Elisabethville [X.1911].

*Prosopocera forchhammeri* Breuning, 1986: 46.

?PT: [Botswana, Serowe, Swaneng Hill, 12.II.77, light, B 71].

*Prosopocera forchhammeriana* Breuning, 1986: 47.

PT: Botswana, Serowe, Swaneng Hill, 23.XI.77, light, Harold von Zyl, B. 812.

*Prosopocera haemorrhoidaloides* Breuning, 1978d: 94.

PT: Ghana, Tafo, V-VIII.1966. leg. E.O. Boafo; 8 ?PT: [idem mais II.1968, E.O. Boafo].

*Prosopocera infragrisea* Breuning, 1950b: 5.

HT: ♂, Transvaal, Shilouvane, leg. H. Junod.

*Prosopocera mussardi* Lepesme & Breuning, 1956: 660.

HT: Côte d'Ivoire, Adzopé, III.1949, rec. R. Mussard, coll. Lepesme.

*Prosopocera parapropinqua* Breuning, 1986: 47.

PT: Botswana, Serowe, Swaneng Hill, 3.XII.1977 (MVL), P. F. leg. [UV, B. 1085].

*Prosopocera rhodesica forchhammeri* Breuning, 1986: 48.

PT: Botswana, Serowe, Swaneng Hill, 20.XI.79, UV, P. F. leg [Forchhammer leg., n° 5110].

*Pseudepilysta loebli* Hüdepohl, 1996: 3.

HT: ♀, Ost-Malaysia, Sabah, Mt. Kinabalu, 1550m, 27.IV.1987, Burckardt - Löbl leg. [23.IV.1987].

*Pseudopharsalia flavostictica* Breuning, 1969b: 194.

PT: Bornéo, Pontianak; ?PT: [Bornéo, Pontianak].

*Pseudozorilispe celebensis* Breuning, 1976a: 208.

PT: Sud Célèbes, Bua Kraeng, 1700m, II.1896, H. Frühstorfer.

*Pterolophia bituberculatoides* Breuning, 1976b: 738.

HT: Malaisie, Singapour.

*Pterolophia egumensis* Breuning, 1973b: 659.

PT: île Egum, Yanarba, XI.1895, leg. Meek.

*Pterolophia flavicollis* Breuning, 1977a: 280.

?PT: [village N Fida, IV- 3.VII.70 / test cacao].

*Pterolophia fusca* Breuning, 1969a: 35.

HT: Ceylan, Peradenya.

*Pterolophia fuscomarmorata* Breuning, 1977a: 280.

?PT: [Cameroun, Nkolbisson, 6.X.71].

*Pterolophia inplagiata* Breuning, 1980e: 166.

?PT: [Insel Mindanao].

*Pterolophia lineatipennis* Breuning, 1974b: 371.

HT: Formose, Puli, Taitung, V-VI.1971, leg. K.H. Chen; PT: idem.

*Pterolophia ochreosignata* Breuning, 1974a: 73.

HT: Philippines, Ile Sibuyan, San Fernando, W. Parson, VII.1928; 2 PT: idem.

*Pterolophia paraforticornis* Breuning, 1976b: 738.

HT: Malaisie, Frasers Hill, 17-30.XI.1974, leg. P. Pfanner.

*Pterolophia paramulticarinata* Breuning, 1977a: 280.

?PT: [N Loubon, 2.VII.71].

*Pterolophia pfanneri* Breuning, 1976b: 738.

HT: Malaisie, Frasers Hill, 17-30.XI.1974, leg. P. Pfanner; PT: idem.

?HT: [Malaisie, Cameron Highland, V.75, P. Pfanner].

*Pterolophia pluricarinipennis* Breuning, 1969a: 34.

HT: ♂, Inde, Perumalinaloi, 21.IV.1927, voyage Carl et Escher [Inde méridionale, Palnis].

*Pterolophia postscutellaris* Breuning, 1967a: 30.

HT: N.E. Assam, 4.VIII.1961, leg. Schmid [Kameng, Nakhu, 3800-4800ft, 4.VII.61].

*Pterolophia rondoniana* Breuning, 1962e: 54.

PT: Vientiane, K17, Tangone, 19.X.62; PT: Vientiane, K17, Paksane, 17.X.62.

*Pterolophia schmidi* Breuning, 1967a: 30.

HT: Inde, Manipur, 9.VI.1960, leg. Schmid [Assam, Sirahi Kashana, 6000-7500ft].

*Pterolophia tenebricoides* Breuning, 1976b: 739.

HT: Malaisie, Singapour.

*Pterolophia woodlarkiana* Breuning, 1973b: 659.

?PT: [Woodlark, Meek. 95].

*Ramularius albsticticus* Breuning, 1964a: 97.

HT: ♂, Lourenco Marques, Makulane, leg. Dr Audeoud; 2 PT: idem.

*Rhodopina assamana* Breuning, 1966c: 15.

HT: ♀, Assam, North-East Frontier Agency, VI.1961, coll. Mussard [Kameng, Nafra, 24.VI.61, 3500-4000ft, Schmid].

*Rhodopina manipurensis* Breuning, 1972c (1971): 416.

HT: ♂, Assam, Manipur, Hkayam Boum, 20.VI.1960, 2300-2600m [Inde, Schmid].

*Rhytiphora correnoides* Breuning, 1970a: 374.

PT: Australie, Dawson Distr., coll. Barnard [Queensland, Monto, 10.I.1975 / 8546].

*Ropica assamensis* Breuning, 1972c (1971): 415.

HT: Assam, Kameng, Shergaon, 9.V.1961, 1850-2000m [Himalaya, 9.V.61, Schmid].

*Ropica ghanaensis* Breuning, 1978d: 95.

2 ?PT: [Ghana, Tafo, II.1968, E.O. Boafo]; ?PT: [idem, mais 9.X.1967].

*Ropica postmaculata* Breuning, 1978d: 95.

?PT: [Ghana, Tafo, II.1968, E.O. Boafo].

*Rucentra smetanai* Hüdepohl, 1992: 179.

4 PT: Bornéo, Sabah, Mt Kinabalu N.P., east base St John's Pk, 4000m, 08.VI-II.1988, Smetana; 2 PT: idem, mais 3900m.

*Saperda gleneoides* Breuning, 1950b: 14.

2 ?PT: [Tonkin. Montes Maous, IV-V, 2-3000', H. Fruhstorfer].

*Saperda mandschukuoensis* Breuning, 1943: 104.

HT: ♂, Kharbine; ?PT: [Mandchuk □ □ □, Charbin].

*Saperda scalaris algeriensis* Breuning, 1952: 176. (Clerm. i. l.).

HT: ♀, Algerien, Yakouren [VI.29, Ou □ □ □]; ?PT: [Kabylie, Yakouren, VI.1902, Dr A. Chobaut].

*Saperda subscalaris* Breuning, 1952: 179.

HT: ♀, China, Provinz Yunnan, Fluss Soling-ho.

*Schoenionta ichneumonoides* Breuning, 1954a: 537.

?PT: [Cochinchine, Cap St Jacques, Baria].

*Schoenionta javanicola* Breuning, 1954a: 538.

HT: ♀, Java, Soekaboemi, Coll. Le Moul. t.

*Schoenionta merangensis* Breuning, 1954a: 539.

?PT: [Sumatra, Medan]; ?PT: [Sumatra, Merang].

*Schoenionta philippinica* Breuning, 1954a: 541.

HT: ♂, Philippinen, Insel Mindanao, Zamboanga, leg. Baker.

*Serixia assamana* Breuning, 1967a: 34.

HT: Assam, Cachar District, 9.V.1960, leg. Schmid [Bandarkhal, 500ft].

*Serixiomenesia flavosignata* Breuning, 1959a: 12.

?PT: [Malakka, Kouala Lumpur].

*Serixiophytoecia vitticollis* Breuning, 1950e: 380.

?PT: [Kuching, Jan. 04, J.H.]; ?PT: [Kuching, 16.IX.1899].

*Setoparmena mussardi* Breuning, 1971b: 305.

HT: Ceylan Central, au-dessus de Talatuoya, 27.I.1970, entre 850 et 1000m, tamisage de forêt [Mussard, Besuchet et Löbl]; PT: idem.

*Similosodus burckhardti* Hüdepohl, 1996: 4.

HT: ♂, Ost-Malaysia, Bornéo, Sabah, Sepilok, IV-V.82, leg. Burckhardt.

*Sophronica allardi* Breuning, 1974d: 777.

?PT: [Ht Zaïre, Kisangani].

*Sophronica ceylanica* Breuning, 1971b: 306.

HT: Ceylan, North central, Medawachchiya, 6.II.1970, à la lumière du Resthouse [Mussard, Besuchet et Löbl].

*Sophronica junodi* Breuning, 1950b: 12.

HT: Transvaal, Shilouvane, leg. Junod.

*Sophronica vittipennis* Breuning, 1986: 55.

PT: Botswana, Serowe, Swaneng Hill, 7.X.77, U.V.

*Spinogoephanes pauliani* Breuning, 1975: 263.

PT: Madagascar Centre, Adringitra Centre, plateau Andohariana (Soaindrana), 2000-2100m, HFAM 1, 9.XI-10.XII.1970.

*Spinomatidia similis* Breuning, 1981a: 46.

PT: Cape Province, King Williamstown, XII.1961, im Humus, N. Leleup.

*Stenellipsis albovittata* Breuning, 1978a: 26.

?PT: [New Caledonia, Nouméa, Mt. Koghi / 12-13.II.1977, leg. Dr J. Balogh].



*Stenellipsis assimilis* Breuning, 1978a: 29.

?PT: [New Caledonia, I. Lifou, Ejengen, 21.II.1977, leg. Dr J. Balogh].

*Stenellipsis basipustulata* Breuning, 1978a: 27.

?PT: [New Caledonia, Mt Mandjelia, 17.II.1977, leg. Dr J. Balogh].

*Stenellipsis fuscolateralis* Breuning, 1978a: 28.

?PT: [New Caledonia, I. des Pins, 23-27.II.1977, leg. Dr J. Balogh]; ?PT: [New Caledonie, I. Lifou, Chépénéhé, 20.II.1977, Dr J. Balogh].

*Stenellipsis kaszabi* Breuning, 1978a: 28.

?PT: [New Caledonia, Boursil, Col. D. Roussettes / 26-27.I.1977, leg. Dr J. Balogh].

*Stenellipsis obscurithorax* Breuning, 1978b: 69.

?PT: [New Caledonia, Mt Panié, 8.X.1977, leg. Dr J. Balogh].

*Stenellipsis postmaculata* Breuning, 1978a: 28.

?PT: [New Caledonia, I. des Pins, 23-27.II.1977, leg. Dr J. Balogh].

*Stenellipsis subunicolor* Breuning, 1978a: 27.

PT: New Caledonia, I. Lifou, Bjengen, 21.II.1977, leg. Dr J. Balogh.

*Stenostola brunnescens* Breuning, 1947c (1946): 144.

HT: ♂, Japon, île Hondo, Gifu.

*Stenostola callosicollis* Breuning, 1943: 100.

HT: Mandchourie, Handaohetzy [VI.1938]; ?PT: [idem].

*Stenostola trivittata* Breuning, 1947c (1946): 143.

HT: ♀, île de Hondo, Chiuzenji; ?PT: [Yunohana, Tateiwa V., Minami-Aizu, 14.VI.1949, Y.K. / North of Nikko, Honshi].

*Stenostola univittata* Breuning, 1947c (1946): 144.

HT: ♂, Hondo, Gifu; ?PT: [idem].

*Stibara nigrovittata* Breuning, 1954a: 467.

2 ?PT: [Burma].

*Sybra frasersi* Breuning, 1976b: 737.

HT: Malaisie, Frasers Hill, 17-30.XI.1974, leg. P. Pfanner.

*Sybra pfanneri* Breuning, 1976b: 737.

HT: Malaisie, Frasers Hill, 17-30.XI.1974, leg. P. Pfanner.

?HT: [Malaisie, Cameron Highlands, V.1975, P. Pfanner].

*Sybra postbasicristata* Breuning, 1974b: 371.

HT: Inde, Kerala, Cardamon Hills, entre Pambanar et Peermade, 950m, 5.XI.1972, leg. Besuchet, Löbl, Mussard.

*Sybrinus albomarmoratus* Breuning, 1978d: 107.

2 ?PT: [Ghana, Tafo, IX-X.1967, E.O. Boafo]; ?PT: [idem mais II.1968].

*Sybrinus flavicans* Breuning, 1978d: 107.

PT: Ghana, Tafo, E.O. Boafo, IV.1968; 2 ?PT: [idem]; ?PT: [idem mais IX-X.1967]; 8 ?PT: [idem mais II.1968]; ?PT: [idem mais VI.1968]; ?PT: [idem mais X.1968].

*Tetraulax junodi* Breuning, 1950b: 6.

HT: ♀, Transvaal, Shilouvane, leg. H. Junod; PT: idem.

*Thyestilla coerulea* Breuning, 1943: 100.

HT: ♀, Chine, province Sétchouen, Tatsienlou [Stötzner].

*Tmesisternus fergussoni* Breuning, 1970b: 478.

?PT: [Ile Fergusson, IX-XII.1924].

*Tmesisternus rosselli* Breuning, 1982: 20.

PT: Rossell I., I-III.98, Meek.

*Trichauxa albovittata descarpentriesi* Breuning, 1975: 262.

HT: Madagascar Centre, Adringitra Est, Anjavidilava, 1850-1950m, FDHM 2, 18.XII.1970-15.I.1971.

*Trichohyllisia mussardi* Breuning, 1957a: 835.

HT: Congo Belge, Uélé, I.1952, coll. Mussard [Bili, Verbeke].

*Trichopterolophia schurmanni* Breuning, 1980c: 49.

PT: ♂, Ile de Bali, Bedugul, XII.1979, leg. Schurmann, coll. Schurmann; PT: idem mais I.80.

*Tricondyloides parinermis* Breuning, 1978a: 25.

PT: Nlle Calédonie, Mt Rembai, 19-21.I.1977, leg. Dr J. Balogh.

*Tuberculetaxalus lumawigi* Breuning, 1980e: 163.

?PT: [Insel Mindanao].

*Zosne matangensis* Breuning, 1950e: 378.

?PT: [Bornéo, Matang]; ?PT: [Matang, 3600ft].

## LISTE 2: NOMS DU NIVEAU INFRA-SUBSPÉCIFIQUE DISPONIBLES

*Nitocris nigrocincta* Aurivillius var. *opaca* Aurivillius, 1907: 38.

2 ST (CT): Deutsch Ost-Africa, Kigonsera [1906].

*Oberea consentanea* Pascoe var. *unicolor* Breuning, 1956f: 236.

?PT: [Fu Kien, Fochow]; ?PT: [Tonkin, Hoa-Binh].

*Oberea euphorbiae* Germar var. *intermedia* Breuning, 1947e: 59.

HT: ♀, Hongrie, Uzghorod [Art. Vavra]; ?PT: [So Sur Sur, Fritsch].

*Oberea formosana* Pic var. *ruficornis* Breuning, 1956f: 235.

?PT: [Chekiang, Tienmuschan].

*Phytoecia gaubili* Mulsant var. *separata* Pic, 1895: 70.

?PT: [Teniet, Alg.].

## LISTE 3: NOMS DU NIVEAU INFRA-SUBSPÉCIFIQUE NON DISPONIBLES

- Agelasta mindanaonis* Breuning m. *albescens* Breuning, 1980e: 158.  
2 ?PT: [Insel Mindanao].
- Agelasta mindanaonis* Breuning m. *nigerrima* Breuning, 1980e: 158.  
?PT: [Insel Mindanao].
- Blepisanis coerulea* Aurivillius m. *viridipennis* Breuning, 1950b: 20.  
HT: ♀, Congo belge, Elisabethville [XI.1911]; ?PT: [Kenya, Ikutha]; ?PT: [Vihl. Nyansa].
- Blepisanis exilis* Pascoe m. *ochreovittata* Breuning, 1950b: 21.  
HT: ♀, Transvaal, Makanete, leg. H. Junod [Ricatla]; ?PT: [Transval, Lichtenburg, XI.1903]; ?PT: [Salisbury, O'Neil, 13.II.1914].
- Blepisanis flavovittata* Breuning m. *albovittata* Breuning, 1950c: 24.  
?PT: [Congo, Elisabethville].
- Blepisanis insignis* Aurivillius m. *lateriflava* Breuning, 1950c: 20.  
2 ?PT: [Belg. Kongo, Elisabethville].
- Blepisanis neavei* Aurivillius m. *aurosternalis* Breuning, 1950c: 20.  
?PT: [Congo, Elisabethville]; ?PT: [E'ville, XI.1911].
- Blepisanis neavei* Aurivillius m. *rufosternalis* Breuning, 1950b: 20.  
2 ?PT: [Kenya, Ikutha].
- Cleptometopus mnischevi* Lacordaire m. *rufovittatus* Breuning, 1966a: 109.  
HT: Nord-Ost-Assam, 3.VII, leg. Schmidt, coll. Mussard [Nakhu].
- Chlorisanis viridis* Pascoe m. *violaceosuturalis* Breuning, 1954a: 454.  
?PT: [Tenasserim, Tandong, 4000', V., Fruhstorfer leg.].
- Conizonia compacta* Ménétriés m. *discovittata* Breuning, 1947e: 59.  
HT: Arménie, Ordubad; ?PT: [Arménie, Ordubad].
- Conizonia warnieri* Lucas m. *brunnea* Breuning, 1954a: 495.  
HT: ♀, Oran, Magenta [M. Rotrou, 1915]; ?PT: [Oran, Magenta].
- Conizonia warnieri* Lucas m. *ruficornis* Breuning, 1954a: 495.  
HT: ♂, Oran, Magenta.
- Dirphyia nigricornis* Olivier m. *pseudonigricornis* Breuning, 1950b: 23.  
HT: ♀, Transvaal, Shilouvane, leg. H. Junod.
- Dorcadion emgei* Ganglbauer m. *multivittatum* Breuning, 1947b (1946): 104.  
HT: ♀, Grèce, Kyllène.
- Dorcadion tibiale* Jakovlev m. *accessorium* Breuning, 1947d (1946): 166.  
HT: ♂, Turkestan, Vallée du Naryn.
- Dorcadion subsericatum* Pic m. *junctum* Breuning, 1962c: 370.  
2 PT: Anatolie, Kastamuni, leg. Breuning [27.IV.59].
- Dorcadion veluchense* Pic m. *peristericum* Breuning, 1947b (1946): 106.  
?PT: [Peristeri, Pindos]; ?PT: [Peristeri].

- Entelopes glauca* Guérin m. *nigroreducta* Breuning, 1954a: 477.  
?PT: [Borneo, Setipas]; ?PT: [id, mais Bornéo occ.].
- Glenea diverselineata* Pic m. *yunnana* Breuning, 1976b: 740.  
HT: Chine, Prov. Yunnan, Tche-Ping-Tcheou.
- Glenea luctuosa* Pascoe m. *rufoabdominalis* Breuning, 1956b: 183.  
?HT: Bougainville, BMNH [Bougainv.].
- Gnathoenia congoana* Belon m. *immaculipennis* Breuning, 1966c: 16.  
HT: ♀, Congo belge, Befori, coll. Mussard [équateur, XII.51].
- Gnathoenia congoana* Belon m. *reticulata* Breuning, 1937: 238.  
?PT: [Congo, Stanleyville].
- Hyllisia leucosuturata* Hunt & Breuning m. *multialbovittata* Breuning, 1981a: 44.  
?PT: [Transval, Kruger Park].
- Linda annulicornis* Matsushita m. *ruficeps* Breuning, 1954a: 553.  
HT: ♀, China, Provinz Yunnan, Yunnanfu [Kouy-tchiou].
- Linda apicalis* Pic m. *yunnana* Breuning, 1976b: 741.  
HT: Chine, Prov. Yunnan, Talifu.
- Linda femorata* Chevrolat m. *rufifrons* Breuning, 1954a: 549.  
HT: ♀, China, Provinz Kweichow, Nanning.
- Linda gracilicornis* Pic m. *rufofemorata* Breuning, 1954a: 550.  
HT: ♂, China, Provinz Szetschuan, Tatsienlu, ex coll. Reitter.
- Linda gracilicornis* Pic m. *tatsienlui* Breuning, 1954a: 550.  
HT: ♀, China, Provinz Szetschuan, Tatsienlu, ex coll. Reitter; ?PT: [Tatsienlu, Szetschuan].
- Linda nigroscutata* Fairmaire m. *conjuncta* Breuning, 1954a: 558.  
2 ?PT: [Yunnan, Yunnan sea].
- Linda nigroscutata* Fairmaire m. *longeplagiata* Breuning, 1954a: 558.  
HT: ♂, China, Provinz Yunnan, Fluss Solingho, ex coll. Hauser; ?PT: [Kuatun, 2500m, 27. 40n. Br., 117.408 L., J. Klapperich, 31.V.1938, Vukien].
- Linda rubescens* Hope m. *unicolor* Breuning, 1954a: 556.  
HT: ♂, Sikkim, Gnatong.
- Linda vitalisi* Vuillet m. *nigroreducta* Breuning, 1954a: 561.  
2 ?PT: [Tonkin, Chapa].
- Loboberea pygidialis* Gahan m. *javaensis* Breuning, 1954a: 533.  
?HT: Java, Preanger, ZMAN [W. Java, Sukabumi, 2000 ft, H. Fruhstorfer];  
?PT: [Java occident., Sukabumi, 2000', 1893, H. Fruhstorfer].
- Loboberea pygidialis* Gahan m. *nigroreducta* (*nigroreducta* orthographe originale incorrecte) Breuning, 1954a: 533.  
HT: ♂, Sumatra, Palembang.
- Loboberea pygidialis* Gahan m. *trimaculata* Breuning, 1950a: 200.  
?PT: [Java, Gounod gedeh]; ?PT: [Sumatra, Palembang].



- Mecas laminata* m. *discopunctata* Breuning, 1955c: 150.  
2 ?PT: [Mexico, Cordova].
- Mecas laminata* m. *rufobasalis* Breuning, 1955c: 150.  
?PT: [Mexico, Cordova]; ?PT: [Mexique].
- Mecas laticeps* m. *mediopunctata* Breuning, 1955c: 151.  
?PT: [N. Yucatan, Temax, Gaumer].
- Mecas laticeps* m. *sutureflava* Breuning, 1955c: 151.  
2 ?PT: [N. Yucatan, Temax, Gaumer].
- Mecas rotundicollis* m. *mediomaculata* Breuning, 1955c: 149.  
?PT: [Mexico, ill., Tehnucax □ □ □].
- Mecas rubripes* m. *callosoreducta* Breuning, 1955c: 143.  
?PT: [Mexico].
- Menesia bimaculata* Breuning m. *latevitticollis* Breuning, 1954a: 424.  
2 ?PT: [Borneo].
- Menesia bimaculata* Breuning m. *prolongatevittata* Breuning, 1954a: 424.  
?PT: [Borneo, Sandakan, Baker].
- Menesia nigriceps* Aurivillius m. *inhumeralis* Breuning, 1954a: 422.  
HT: ♀, Borneo, Sandakan, leg. Baker; ?PT: [Malacca / Staudinger].
- Menesia sulphurata* Gebler m. *gifuensis* Breuning, 1954a: 410.  
HT: ♀, Japan, Insel Gifu, Hondo, Provinz Amagodani, 13.VIII.1947, leg. Kohbayashi.
- Menesida flavipennis* Breuning m. *basiflava* Breuning, 1954a: 446.  
?PT: [Sumatra, Medan].
- Menesida flavipennis* Breuning m. *mediofusca* Breuning, 1954a: 446.  
2 ?PT: [Sumatra, Medan].
- Nitocris schoutedeni* Breuning m. *verbekei* Breuning, 1957b: 206.  
HT: ♂, Congo Belge, Uele, coll. Mussard [Bili, 1952, Verbeke].
- Nupserha ugandensis* Breuning m. *nigrolateralis* Breuning, 1978d: 112.  
?PT: [Uganda, Entebbe, II-VII.1972, Exp. H. Falke].
- Oberea angolensis* Breuning var. *bimaculaticeps* Breuning, 1961b: 62.  
HT: ♂, Angola. Bailundo.
- Oberea angolensis* Breuning var. *nigritomaculata* Breuning, 1961b: 62.  
HT: ♀, North West Rhodesia.
- Oberea annulicornis* Pascoe var. *craengiana* Breuning, 1961b: 120.  
?HT: ♀, Celebes, Bonthain, leg. Ribbe, MNHN [S.Celebes, Bua-Kraeng, 5000', II.1896, H. Fruhstorfer]; ?PT: [S.Celebes, Lompa-Battau, 3000ft, III.96, H. Fruhstorfer].
- Oberea annulicornis* Pascoe var. *umbrosior* Breuning, 1961b: 120.  
?PT: [Celebes, Tamboegoe].
- Oberea artocarpis* Gardner m. *trifusciventris* Breuning, 1962a: 147.  
2 ?PT: [Inseln Andamanen].



- Oberea atricilla* Fairmaire m. *apicenigrescens* Breuning, 1950c: 41.  
?PT: [Kamerun, Mt Bronje-Farm]; ?PT: [Cameroons, Bitey-Ja River, 3000 feet].
- Oberea atricilla* Fairmaire var. *asmarensis* Breuning, 1961b: 82.  
HT: ♂, Erythrée, Asmara [VIII].
- Oberea atricilla* Fairmaire var. *bimaculiventris* Breuning, 1961b: 82.  
HT: ♀, Cameroun, Ja River [Bitey Ja River].
- Oberea atricilla* Fairmaire m. *parteruficeps* Breuning, 1950c: 41.  
?PT: [Congo français, N'Djolé, J. Arrighi]; ?PT: [Cameroons, Bitey Ja River, 3000 ft].
- Oberea atricilla* Fairmaire m. *rufopygidialis* Breuning, 1950c: 41.  
?PT: [Cameroons, Bitey-Ja River, 3000 feet]; ?PT: [Kenya, Ikutha].
- Oberea basalis* Chevrolat m. *flavicans* Breuning, 1950c: 42.  
?PT: [Gabon]; ?PT: [Gabon, Bas Ozooné, Favarel].
- Oberea bicoloricornis* Pic var. *rubroantennalis* Breuning, 1962a: 186.  
HT: ♀, Chine, province Szetschuan, Tatsienlu [Reitter].
- Oberea cingulata* Aurivillius m. *parteflavosternalis* Breuning, 1964a: 102.  
HT: Uganda [Afr. c., coll. Plason].
- Oberea consentanea* Pascoe m. *mausoni* Breuning, 1950d: 274.  
2 ?PT: [Tonkin, Montes Mauson, IV-V, 2000', H. Fruhstorfer].
- Oberea curialis* Pascoe m. *nigroscapus* Breuning, 1950b: 25.  
?PT: [Java Orient., Mt Ardjoeno]; ?PT: [L'Ile de Ceram, V.M. Duchon].
- Oberea davaoensis* Breuning var. *antenigrocollis* Breuning, 1961b: 139.  
PT: Ile Mindanao, Davao; ?PT: [idem].
- Oberea depressa* Gebler m. *infradepressa* Breuning, 1967b: 40.  
HT: ♂, Mandchourie, Ile Askold [M. Jackowskie, 1880]; PT: idem [42,5° lat. N, 102° long., 1878].
- Oberea depressa* Gebler var. *subdepressa* Breuning, 1962a: 215.  
HT: ♀, Chine, prov. Kiangi-si, Kiu-kiang.
- Oberea discoidalis* Jordan var. *maculisternalis* Breuning, 1961b: 86.  
HT: ♂, Cameroun, Ja River [3000 feet].
- Oberea erythrocephala* Schrank m. *macedonica* Breuning, 1947e: 58.  
HT: ♀, Macédoine, Usküb [2.6.68]; ?PT: [Bulgarien, Stanimaka, VII.33, Pfeiffer].
- Oberea erythrostoma* Heller var. *antenigrescens* Breuning, 1961b: 135.  
HT: ♀, Ile Samar [VI-VII.96, J. Whithead].
- Oberea erythrostoma* Heller var. *banahoana* Breuning, 1961b: 135.  
HT: ♀, Ile Luzon, Mt Banahao; PT: Insel Luzon, Laguna.
- Oberea erythrostoma* Heller var. *cebuensis* Breuning, 1961b: 134.  
HT: ♂, Philippines, Ile Cebu; PT: idem.
- Oberea erythrostoma* Heller var. *medionigricollis* Breuning, 1961b: 135.  
HT: ♂, Ile Luzon.
- Oberea erythrostoma* Heller var. *melanothorax* Breuning, 1961b: 135.  
HT: ♀, Ile Luzon, Mt Isorong; PT: idem.
- Oberea erythrostoma* Heller var. *partenigripes* Breuning, 1961b: 136.  
HT: ♂, Ile Luzon, Albay [Whithead, 94].

- Oberea erythrostoma* Heller var. *pseudomakilingi* Breuning, 1961b: 135.  
?PT: [Mindoro]; ?PT: [Philipp.].
- Oberea erythrostoma* Heller var. *ruficuspis* Breuning, 1961b: 135.  
HT: ♂, Ile Luzon, Laguna.
- Oberea erythrostoma* Heller var. *samarana* Breuning, 1961b: 135.  
HT: ♀, Ile Samar [VI-VII.96, J. Whithead].
- Oberea erythrostoma* Heller var. *samarensis* Breuning, 1961b: 135.  
HT: ♀, Ile Samar [VI-VII.96, J. Whithead].
- Oberea formosana* Pic var. *spinipennis* Breuning, 1962a: 163.  
?PT: [S.E. Borneo].
- Oberea fuscicollis* Breuning var. *fuscolateralis* Breuning, 1961b: 138.  
HT: ♂, Ile Luzon, Cap Engano [Whitehead leg.].
- Oberea fuscicollis* Breuning var. *infrarufescens* Breuning, 1961b: 138.  
?PT: [Philippines, Mindanao, Surigao].
- Oberea fuscicollis* Breuning var. *mindanaonis* Breuning, 1961b: 139.  
HT: ♂, Ile Mindanao; ?PT: [Luzon, mt B □ □ □].
- Oberea griseopennis* Schwarzer var. *basimaculata* Breuning, 1962a: 219.  
HT: ♂, Formosa, Sozan [30.IV.1933, Col. M. Chujo]; ?PT: [S. Formosa, Alikang, VI.09, Sauter S. V.].
- Oberea herzi* Ganglbauer var. *longevittata* (Pic i.l.) Breuning, 1962a: 205.  
HT: ♀, Corée, Pu Ryöng; ?PT: [Korea, Pu Ryong].
- Oberea herzi* Ganglbauer var. *mediomaculata* Breuning, 1962a: 205.  
HT: ♂, Mandchourie, Handaohstzy.
- Oberea herzi* Ganglbauer var. *rufipennis* Breuning, 1962a: 205.  
HT: ♂, Chine, Nanking.
- Oberea humeralis* Gressitt var. *fruhstorferi* Breuning, 1962a: 180.  
HT: ♀, Tonkin, Mts Mauson, 700-1000m, IV-V, leg. Fruhstorfer.
- Oberea humilis* Fairmaire var. *togoensis* Breuning, 1961b: 78.  
PT: Togo, Bismarckburg, leg. Conradt.
- Oberea humilis* Fairmaire m. *pseudohumilis* Breuning, 1950c: 42.  
?PT: [Kamerun, Bitey River].
- Oberea inclusa* Pascoe var. *partenigrescens* Breuning, 1962a: 203.  
HT: ♂, Corée, Pu Ryong.
- Oberea insperans* Pascoe m. *celebesiana* Breuning, 1950a: 199.  
?PT: [Celebes, Makassar].
- Oberea japonica* Thunberg m. *infranigrescens* Breuning, 1947e: 58.  
HT: ♀, Japon, Omi [Centr. Japan, Omi, Zeze, VI.96, T. Lenz v., 12.IX.96]; ?PT: [Japon, Kioto, Villion].
- Oberea lacana* Pic m. *mediofuscofemoralis* Breuning, 1967b: 40.  
HT: ♀, Cambodge.
- Oberea lacana* Pic var. *orientalis* Breuning, 1961b: 95.  
HT: ♂, Tonkin, Hoabinh; ?PT: [Tonkin occ., Rég. de Hoa Binh].
- Oberea laetifica* Pascoe var. *toliensis* Breuning, 1961b: 122.  
HT: ♂, Célèbes, Toli-Toli; ?PT: [N. Celebes, Toli-Toli, Fruhstorfer].

- Oberea lateapicalis* Pic var. *rufobasalis* Breuning, 1962a: 151.  
HT: ♂, Inde, Anamalai Hills.
- Oberea lepesmei* Breuning, var. *haemorrhoidalis* Breuning, 1961b: 91.  
?PT: [Togo, Bismarckburg].
- Oberea longissima* Aurivillius var. *basirufa* Breuning, 1961b: 91.  
?PT: [Cameroons, Bitye-Ja River]; ?PT: [Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, V.32, J. Lepesme].
- Oberea luluensis* Breuning, var. *atricollis* Breuning, 1961b: 88.  
HT: ♂, Cameroun, Mukonje Farm; ?PT: [Belg. Congo, Yungumbi, Fraser].
- Oberea lutea* Thunberg var. *nigroapicalis* Breuning, 1962a: 154.  
?PT: [Maissour, Shiroga]; ?PT: [Darjoeling, Mus. Vaekenfurg].
- Oberea macilenta* Newman var. *anterubripes* Breuning, 1961b: 140.  
?PT: [Philippis]; ?PT: pas d'étiquette de localité.
- Oberea melanostoma* Heller var. *melas* Breuning, 1961b: 136.  
HT: ♀, Ile Luzon, Mt Isorog; ?PT: [Philips].
- Oberea melanostoma* Heller var. *rufinithorax* Breuning, 1961b: 136.  
?HT: [Pancan N □ □ □]; ?PT: [Ambulanga].
- Oberea mimetica* Heller var. *boholensis* Breuning, 1962a: 146.  
HT: ♀, Philippines, Ile Bohol; ?PT: [Luzon / Mt Banahao, IV.1914, Boettcher].
- Oberea mimetica* Heller var. *pseudomimetica* Breuning, 1962a: 145.  
HT: ♀, Philippines.
- Oberea mimetica* Heller var. *submimetica* Breuning, 1962a: 145.  
?PT: [Luzon, Mt Banahao].
- Oberea montivagans* Fisher var. *rubroscapus* Breuning, 1962a: 158.  
HT: ♀, Java, Pranger; ?PT: [Java].
- Oberea neavei* Aurivillius var. *antennalis* Breuning, 1961b: 75.  
?PT: [C. Belge, ill.].
- Oberea nefasta* Pascoe var. *atroampliata* Breuning, 1961b: 129.  
HT: ♀, Nouvelle Guinée, Geelwinck Bay, leg. Doherty.
- Oberea nefasta* Pascoe var. *flavoabdominalis* Breuning, 1961b: 129.  
HT: ♂, Nouvelle Guinée, Andai, leg. Doherty; ?PT: [Fergusson I., IX-XII.94, A.S. Meek].
- Oberea nefasta* Pascoe var. *rufuloides* Breuning, 1961b: 129.  
HT: ♂, Ile Roon près Nouvelle Guinée; ?PT: [N. Guineen, Warao].
- Oberea neptis* Pascoe var. *plurimaculiventris* Breuning, 1962a: 161.  
?PT: [Sumatra's O.K., Brastagi, 1300m, 6.IV.1918, J.B. Corporaal].
- Oberea nigerrima* Breuning m. *anterufofemoralis* Breuning, 1964b: 6.  
HT: ♂, Java, Batavia.
- Oberea nigerrima* Breuning var. *discovittata* Breuning, 1961b: 100.  
HT: ♂, Java; PT: Java, Soekaboemi.
- Oberea nigerrima* Breuning var. *rubricollis* Breuning, 1961b: 100.  
HT: ♀, Java, Soekaboemi.
- Oberea nigrocincta* Aurivillius m. *camerunensis* Breuning, 1964b: 6.  
HT: ♂, Cameroun, Kriby.

- Oberea nigriceps* White m. *flavipennis* Breuning, 1950a: 199.  
?PT: [Formosa, Kosempo, Coll. Sauter]; ?PT: [China, Hong-Kong].
- Oberea nigriceps* White var. *nigromaculicollis* Breuning, 1962a: 183.  
HT: ♂, Chine, Ngan hwei.
- Oberea nigriceps* White m. *obscuripennis* Breuning, 1967b: 40.  
HT: ♂, Tonkin, Monts Mauson, V-VI, 700-1000m alt., leg. H. Fruhstorfer [IV-V, 2-3000'].
- Oberea nigripennis* Breuning m. *rufiniscapus* Breuning, 1950c: 38.  
?PT: [Gabon, Bas Ozooné].
- Oberea nigriventris* Bates var. *postrufofemoralis* Breuning, 1961b: 94.  
HT: ♂, Chine, Prov. Fokien, Foochow.
- Oberea notata* Pic var. *rufoantennata* Breuning, 1962a: 196.  
HT: ♂, Chine, prov. Chekiang, Kiukiang; ?PT: [Chekiang, Kiu Kiang].
- Oberea nyassana* Breuning m. *kenyensis* Breuning, 1955a: 76 ou Breuning, 1958a: 37.  
?PT: [Kenya, Ikutha].
- Oberea nyassana* Breuning var. *laterinigra* Breuning, 1961b: 74.  
?PT: [Mozambique, Zambesie].
- Oberea occidentalis* Lepesme & Breuning var. *apicenigra* Breuning, 1961b: 89.  
HT: ♀, Sierra Leone, Moyamba.
- Oberea pedemontana* Chevrolat m. *subtestacea* Breuning, 1947e: 58.  
HT: ♂, Tyrol, Rovereto; ?PT: [Tirol, Rovereto].
- Oberea pictipes* Pascoe m. *nigrofemorata* Breuning, 1956g: 23.  
?HT: Java, ISNB [Java]; ?PT: [Java, Mlle Badollet, 623-29].
- Oberea pictipes* Pascoe var. *rubripes* Breuning, 1961b: 108.  
HT: ♂, Bornéo.
- Oberea pictipes* Pascoe var. *tenasserimensis* Breuning, 1961b: 108.  
2 ?PT: [Malacca, Perak].
- Oberea posticata* Gahan var. *rubroantennata* Breuning, 1962a: 165.  
HT: ♂, Assam, Suriga.
- Oberea praedita* Pascoe var. *antenigripes* Breuning, 1961b: 116.  
?PT: [Borneo, Pontianak].
- Oberea pseudopascoei* Breuning m. *propinqua* Breuning, 1950c: 41.  
2 ?PT: [Gabon, Bas Ozooné].
- Oberea pseudovaricornis* Hunt & Breuning m. *fuscoampliata* Breuning, 1978d: 115.  
3 ?PT: [Prov. du Cap, Port St-John, II.1963, leg. G. Heinrich].
- Oberea pseudovaricornis* Hunt et Breuning var. *mossambicensis* Breuning, 1961b: 73.  
HT: ♂, Mossambique, Zambezi.
- Oberea puncticollis* Breuning var. *crassepuncticollis* Breuning, 1962a: 146.  
HT: ♂, Ile Luzon, prov. Tayabas, Infante; ?PT: [Philippines, Luzon, Prov. Laguna].
- Oberea pupillata* Gyllenhal m. *bimaculatoides* Breuning, 1947e: 58.  
HT: ♂, Moravie, Prostějov; ?PT: [Skuje, Vlach.].
- Oberea pupillata* Gyllenhal m. *pseudodepressa* Breuning, 1947e: 58.  
HT: ♂, Sibérie, Krasnojarsk; ?PT: [Sibir., Irtysch].



- Oberea quianga* Heller var. *partefuscollicis* Breuning, 1961b: 137.  
HT: ♂, Ile Cebu.
- Oberea reimschi* Breuning var. *merangana* Breuning, 1961b: 105.  
?HT: Sumatra, Merang, coll. Breuning [Sumatra, Medan].
- Oberea rubetra* Pascoe var. *basinigrillicollis* Breuning, 1961b: 113.  
HT: ♂, Bornéo.
- Oberea rubetra* Pascoe var. *mediorufinipes* Breuning, 1961b: 113.  
?PT: [Sumatra, Medan]; ?PT: [Sumatra occident.].
- Oberea rubetra* Pascoe var. *parterufipes* Breuning, 1961b: 113.  
HT: ♀, Bornéo, Sandakan, leg. Baker; ?PT: [Borneo, Sandakan, Baker].
- Oberea ruficollis* Fabricius var. *rufolineata* Breuning, 1962a: 227.  
HT: ♀, Floride, Stanford [V et VI.95].
- Oberea sansibarica* Harold var. *binigromaculata* Breuning, 1961b: 63.  
HT: ♂, Kenya, Maguga [6.III.54].
- Oberea schaumii* Le Conte var. *infrarufa* Breuning, 1962a: 223.  
HT: ♂, Californie, Mariposa [VI.74]; ?PT: [U.S., California].
- Oberea schaumii* Le Conte var. *vittipennis* Breuning, 1962a: 224.  
2 ?PT: [U.S., Ohio].
- Oberea scutellaroides* Breuning m. *rufithorax* Breuning, 1947e: 58.  
HT: ♂, Chine, province Tchékiang, Tschenkiang [2.VI.18]; ?PT [China].
- Oberea seminigra* Chevrolat m. *clareabdominalis* Breuning, 1956d: 700.  
?PT: [Philipp., Semp □ □ □]; ?PT: [Philippines, Luzon, Bilucao, La Laguna].
- Oberea sobrina* Boisduval var. *basifuscoabdominalis* Breuning, 1961b: 127.  
?PT: [Insel Ceram].
- Oberea subabdominalis* Breuning var. *momeitensis* Breuning, 1962a: 167.  
HT: ♂, Birmanie, Momeit [Hte Birmanie, Etat de Momeit, 600m].
- Oberea suturalis* Jordan var. *flaveola* Breuning, 1961b: 79.  
?PT: [Kamerun, Mukonje Farm]; ?PT: [Ogowe].
- Oberea taihokuensis* Breuning var. *flavosternalis* Breuning, 1962a: 169.  
HT: ♂, Formose, Kosempo; ?PT : [ill., Kurau].
- Oberea tricolor* Aurivillius var. *binaluanica* Breuning, 1961b: 112.  
?PT: [Kinabalu].
- Oberea tricolor* Aurivillius var. *discoclarior* Breuning, 1961b: 112.  
HT: ♂, Ile de Bali, III-IV.1896, leg. Doherty.
- Oberea trigonifera* Aurivillius m. *maculiventralis* Breuning, 1958a: 37.  
?PT: [Kap Colony, East London]; ?PT: [ill., Peramiha, 1905].
- Oberea tripunctata* Swedenbord var. *subdeficiens* Breuning, 1962a: 229.  
HT: ♂, New York.
- Oberea tripunctata* Swedenbord var. *subexilis* Breuning, 1962a: 228.  
HT: ♀, Canada, Montréal [Que., VI.].
- Oberea tripunctata* Swedenbord var. *submandarina* Breuning, 1962a: 229.  
HT: ♀, Missouri.
- Oberea unimaculicollis* Breuning var. *nigroampliata* Breuning, 1962a: 194.  
HT: ♀, Sumatra, Medan.



- Oberea varicornis* Fåhraeus m. *laterinigrescens* Breuning, 1950c: 41.  
?PT: [Delazoa, Bai.]; ?PT: [Mozambique, Zambezi].
- Oberea viperina* Pascoe var. *burmanensis* Breuning, 1961b: 104.  
?PT: [Burma].
- Oberea viperina* Pascoe var. *clariventris* Breuning, 1961b: 103.  
HT: ♂, presqu'île de Malacca, Perak, Gounong-Boubou, leg. Doherty [1100m].
- Oberea viperina* Pascoe var. *penangensis* Breuning, 1961b: 104.  
PT: Malacca, Perak, Doherty.
- Oberea viperina* Pascoe var. *transitiva* Breuning, 1961b: 103.  
HT: ♂, Ile Engano.
- Oberea walkeri* Gahan var. *sikkimensis* Breuning, 1961b: 185.  
HT: ♂, Sikkim, Darjeeling, leg. Andrewes.
- Oberea yunnanensis* Breuning var. *atripennis* Breuning, 1961b: 98.  
HT: ♂, Chine, province Yunnan, Solingho.
- Obereopsis sericea* Gahan m. *subluteonigra* Breuning, 1966c: 16.  
HT: ♂, Manipur, Poi, 1200m, 4.VII.1960, coll. Mussard [Assam].
- Obereopsis verticenigra* Breuning f. *flavoabdominalis* Breuning, 1974b: 374  
(*flvoaabdominalis* orthographe originale incorrecte).  
HT: Inde, Kerala, Trivandrum Dt., Poonmudi Range, 950m, V.1972, leg. T.R.S. Nathan.
- Ossonis clytomima* Pascoe m. *flavotibialis* Breuning, 1954a: 430.  
HT: ♂, Borneo, Sandakan, leg. Baker.
- Paradystus notator* Pascoe m. *fuscoampliat* Breuning, 1954a: 459.  
HT: Soekaranda, I.1894, Dohrn; ?PT: [Medan, Mjööb].
- Paradystus notator* Pascoe m. *sericeoprolongatus* Breuning, 1954a: 459.  
?PT: [Borneo, Sandakan, Baker]; ?PT: [ill., Lawas, II-III.96, A. Everett].
- Paraglenea fortunei* Saunders m. *clarevittata* Breuning, 1952: 126.  
HT: ♀, China, Insel Chusan.
- Paraglenea fortunei* Saunders m. *conjunctefasciata* Breuning, 1952: 126.  
HT: ♂, China, Provinz Szetschuan, Tatsienlu.
- Paraglenea fortunei* Saunders m. *unicoloripennis* Breuning, 1952: 127.  
HT: ♂, China, Insel Chusan; ?PT: [idem].
- Paraglenea fortunei* Saunders m. *viridicollis* Breuning, 1952: 125.  
HT: ♂, China, Provinz Hupe, Ichang; ?PT: [idem].
- Pardaloberea curviteps* Pic m. *partenigrescens* Breuning, 1954a: 534.  
?PT: [Tonkin, Hoa-Binh].
- Phytoecia algerica* Desbrochers des Loges m. *nigroanal* Breuning, 1947e: 59.  
HT: Algérie; ?PT: [Oran].
- Phytoecia analis* Fabricius m. *rufescens* Breuning, 1951: 443.  
2 ?PT: [Côte d'Ivoire, Dimbokro].

- Phytoecia aurivillii* Breuning m. *violaceipennis* Breuning, 1951: 410.  
HT: ♀, Angola, Bailundo; ?PT: [Kenya, Ikitha].
- Phytoecia balcanica* Frivaldszky m. *subvitticollis* Breuning, 1951: 92.  
HT: ♂, Anatolie, Amasia, leg. Korb [1888]; ?PT: [Balkan].
- Phytoecia bodemeyeri* Reitter m. *luristanica* Breuning, 1947e: 59.  
HT: ♂, Louristan [Persia]; ?PT: [Persia, Luristan].
- Phytoecia bodemeyeri* Reitter m. *rufofemorata* Breuning, 1947e: 59.  
HT: ♀, Louristan [Persien, v. Bodemeyer].
- Phytoecia coerulescens* Scopoli m. *marthae* Breuning, 1951: 100.  
HT: ♀, Catalogne, San Feliù de Guixols, 18.V.1950; ?PT: [Colline Morières, 28.V.1908].
- Phytoecia collaris* Pascoe m. *bulbosa* Breuning, 1951: 414.  
?PT: [P. Natal / M. Germ.].
- Phytoecia comes* Bates m. *griseopubescens* Breuning, 1951: 96.  
HT: ♂, Ile Hondo, Chiuzenji; ?PT: [Hondo, Chiuzenji].
- Phytoecia comes* Bates m. *ohbayashii* Heyrovsky, 1952: 13.  
?PT: [Oomor-Jap., coll. Dr Heyrovsky].
- Phytoecia delagrangei* Pic m. *subgrisea* Breuning, 1951: 354.  
HT: ♂, Marasch [V.28, Taurus, leg. H. Kulzer]; ?PT: [Marasch, V.28, Taurus, leg. H. Kulzer].
- Phytoecia erivanica* Reitter m. *rufipennis* Breuning, 1947e: 59.  
HT: ♂, Transcaucasie, Suchoj-Fontan [1910, H. Kulzer]; ?PT: [Suchoj Fontan, 1910, H. Kulzer].
- Phytoecia erythaca* Pascoe m. *nigritipennis* Breuning, 1951: 412.  
?PT: [Zulu, Caffraria].
- Phytoecia erythaca* Pascoe m. *parteruficeps* Breuning, 1951: 412.  
HT: ♂, Zululand [Zulu, Caffraria].
- Phytoecia exilis* Pascoe m. *vittulipennis* Breuning, 1951: 422.  
HT: ♀, Transvaal.
- Phytoecia ferrugata* Ganglbauer ab. *houskai*, Heyrovsky, 1948: 20.  
PT: Palestine, Jerusalem, Houska leg.
- Phytoecia fervida* Pascoe m. *nigriceps* Breuning, 1951: 418.  
?PT: [Natal].
- Phytoecia fervida* Pascoe m. *nigrodiscahis* Breuning, 1951: 418.  
?PT: [ill., Maloen, 61 □ □ □ 99, JP Ce..].
- Phytoecia fervida* Pascoe m. *rufinitibialis* Breuning, 1951: 418.  
?PT: [Natal].
- Phytoecia flavovittata* Breuning m. *latevittipennis* Breuning, 1964b: 7.  
HT: ♀, Congo, Elisabethville.
- Phytoecia flavovittata* Breuning m. *latevitticollis* Breuning, 1951: 424.  
2 ?PT: [Mozambique, Zambesi].
- Phytoecia geniculata* Kolbe m. *flaviventris* Breuning, 1950c: 44.  
?PT: [Belg. Kongo, Beni].
- Phytoecia geniculata* Kolbe m. *fuscibasicornis* Breuning, 1950b: 31.  
?PT: [Côte d'Ivoire, Dimbokro]; ?PT: [Niger, Ogruga].

- Phytoecia geniculata* Kolbe m. *pusilla* Breuning, 1950b: 31.  
?PT: [Côte d'Ivoire, Dimbokro]; ?PT : [Togo].
- Phytoecia geniculata* Kolbe m. *subternigra* Breuning, 1950c: 44.  
2 ?PT: [Côte d'Ivoire, Dimbokro].
- Phytoecia haroldii* Fähræus m. *atricornis* Breuning, 1951: 453.  
2 ?PT: [Kenya, Ikuta].
- Phytoecia haroldii* Fähræus m. *bipunctulicollis* Breuning, 1951: 454.  
HT: ♂, Tanganyica, Lindi [D. O. Afr.].
- Phytoecia haroldii* Fähræus m. *holatripes* Breuning, 1951: 453.  
HT: ♀, Tanganyica, Lindi [Teir].
- Phytoecia haroldii* Fähræus m. *ornaticollis* Breuning, 1950c: 46.  
?PT: [Kenya, Nairobi, 1660m].
- Phytoecia haroldii* Fähræus m. *tripuncticollis* Breuning, 1950c: 46.  
?PT: [Kenya, Ikuta]; ?PT: [D.O. Afrika, Kigonsera].
- Phytoecia haroldii* Fähræus m. *unimaculata* Breuning, 1951: 453.  
?PT: [N.W. Rhodesia, Lusemska, H.C. Dollman, XII.1916]; ?PT: [Salisbury, ill., Mahon].
- Phytoecia haroldii* Fähræus m. *verticepunctata* Breuning, 1951: 453.  
?PT: [N.W. Rhodesia, Lusemska, H.C. Dollman, XII.1916]; ?PT: [Nairobi, B.E.A.].
- Phytoecia haroldii* Fähræus m. *vitticollis* Breuning, 1950c: 46.  
?PT: [Kilimandjaro, Sjöstedt., 1905.6. / Kibonoto, kulturz]; ?PT: [Mozambique, Zambezi].
- Phytoecia kolbei* Breuning m. *flavoabdominalis* Breuning, 1951: 445.  
2 ?PT: [Togoland, L. Conradt, 1892-1893].
- Phytoecia kolbei* Breuning m. *ruf antennata* Breuning, 1951: 444.  
HT: ♀, Togo, Bismarckburg.
- Phytoecia kolbei* Breuning m. *togoensis* Breuning, 1951: 444.  
HT: ♀, Togo, Bismarckburg.
- Phytoecia kurdistan* Ganglbauer m. *bitlisensis* Breuning, 1947e: 60.  
HT: ♂, Arménie. Bitlis [1912, Kulzer]; ?PT: [Bitlis, 1912, Kulzer].
- Phytoecia kurdistan* Ganglbauer m. *quinquemaculata* Breuning, 1947e: 60.  
HT: ♂, Erivan [Eriwan, 1898, Korb]; ?PT: [Eriwan, 1898, Korb].
- Phytoecia larvata* Pascoe m. *fuscoantennata* Breuning, 1951: 429.  
?PT: [Shilouvane, H. Junod].
- Phytoecia maculicollis* Peringuey m. *anterufa* Breuning, 1951: 413.  
HT: ♂, Transvaal [Grauer]; ?PT: [Transvaal, Grauer].
- Phytoecia mannerheimi* Breuning m. *atroapicaloides* Breuning, 1951: 369.  
HT: ♂. Chine, province de Shansi [Licent].
- Phytoecia millefolii* Adams m. *obscuripennis* Demelt, 1963b: 96.  
PT: Asia Minor, Silifke.
- Phytoecia neavei* Aurivillius m. *senegalensis* Breuning, 1951: 428.  
2 ?PT: [Sénégal].
- Phytoecia neavei* Aurivillius m. *unimaculicollis* Breuning, 1951: 428.  
HT: ♀, Congo belge, Beni.

- Phytoecia nigriventris* Kolbe m. *anterufipes* Breuning, 1951: 447.  
?PT: [Togo, Bismarckburg].
- Phytoecia nigriventris* Kolbe m. *dimidiatoides* Breuning, 1951: 448.  
?PT: [Belg Kongo].
- Phytoecia nigriventris* Kolbe m. *fuscicornis* Breuning, 1950c: 45.  
2 ?PT: [Kamerun, Mukonje Farm].
- Phytoecia nigriventris* Kolbe m. *nigroantennata* Breuning, 1950c: 45.  
?PT: [Belg Kongo, Beni].
- Phytoecia nigriventris* Kolbe m. *rufina* Breuning, 1950c: 45.  
2 ?PT: [Belg Kongo].
- Phytoecia nigriventris* Kolbe m. *uninotata* Breuning, 1950c: 45.  
2 ?PT: [Kamerun, Mukonje Farm].
- Phytoecia orbicollis* Reiche et Saulcy m. *adanensis* Breuning, 1947e: 60.  
HT: Cilicie, Adana [Asia Minor, Adana, coll. Sterba]; ?PT: [Asia Minor, Taurus eilic, Kricheldorf].
- Phytoecia orbicollis* Reiche et Saulcy m. *ankarensis* Breuning, 1964a: 97.  
HT: ♂, Anatolie, Ankara, Dikmen-deresi, 1.VI.1941, leg. J. Romieux.
- Phytoecia orbicollis* Reiche et Saulcy m. *maraschensis* Breuning, 1951: 54.  
HT: ♂, Marasch, leg. Sahlberg [Taurus]; ?PT: [Taurus, Marasch, V.28, leg. H. Kulzer].
- Phytoecia pontica* Ganglbauer m. *discomaculata* Breuning, 1947e: 61.  
?HT: Syrie, Damas, coll. Breuning [Kastamani]; ?PT: [Damascus / U. Sahlb].
- Phytoecia pretiosa* Falderman m. *basiimmaculata* Breuning, 1947e: 61.  
HT: ♀, Perse; ?PT: [Armenien, Erze □ um, Reitter].
- Phytoecia pretiosa* Falderman m. *nigroconjuncta* Breuning, 1947e: 61.  
HT: Perse, Tabris.
- Phytoecia pseudaficana* Breuning m. *holorufa* Breuning, 1951: 449.  
?PT: [Kenya, Ikutha].
- Phytoecia pseudaficana* Breuning m. *subteratra* Breuning, 1964a: 103.  
HT: ♂, Uganda [Afr. c. coll. Plason]; ?PT: [Kenya, Mo □ □].
- Phytoecia pseudolatesuturalis* Breuning m. *bivittipennis* Breuning, 1962b: 15.  
?PT: [Kaimosi].
- Phytoecia puncticollis* Falderman m. *nigrifrons* Breuning, 1951: 86.  
HT: ♀, Luristan, leg. Bodemeyer [Persia].
- Phytoecia puncticollis* Falderman m. *nigroscapus* Breuning, 1951: 86.  
HT: ♀, Luristan, leg. Bodemeyer; ?PT: [Persia, Kereda].
- Phytoecia puncticollis* Falderman m. *quadripunctata* Breuning, 1951: 87.  
HT: ♀, Luristan, leg. Bodemeyer [Persien].
- Phytoecia puncticollis* Falderman m. *transitoria* Breuning, 1951: 85.  
HT: ♀, Luristan, leg. Bodemeyer [Persien]; ?PT: [Persien, Sultarabad, v. Bodemeyer].
- Phytoecia pustulata* Schrank m. *coeruleomicans* Breuning, 1947e: 59.  
HT: Maroc, Meknés.
- Phytoecia pustulata* Schrank m. *parterufoabdominalis* Breuning, 1951: 386.  
HT: ♂, Anatolie, Ak-Chehir [V.26, Kulzer]; ?PT: [Roumanie, Comana Vlasca, A.L. Montandon].



- Phytoecia rubropunctata* Goeze m. *confluentevittata* Breuning, 1947e: 60.  
HT: France, Lyon [Kelecsényi]; ?PT: [Macon].
- Phytoecia rufa* Breuning m. *latesuturevittata* Breuning, 1965b: 284.  
HT: ♀, Nordrhodesien, Abercorn [Rhodésie du Nord, Abercorn, 4.IV.1944, H.J. Brédo].
- Phytoecia ruficollis* Aurivillius m. *ochreicollis* Breuning, 1951: 408.  
HT: ♂, Oubanghi Chari, Bangui; ?PT: [Sénégal, Dakar].
- Phytoecia rufiventris* Gautier de Cottés m. *partenigrecens* Breuning, 1947e: 60.  
HT: ♂, Chine, province Foukien; ?PT: [Hondo, Chinzenji].
- Phytoecia somereni* Breuning m. *fuscoapicalis* Breuning, 1951: 449.  
2 ?PT: [Kenya, Ikutha].
- Phytoecia sublateralis* Breuning m. *rufodiscalis* Breuning, 1951: 435.  
HT: ♀, Angola, Bailundo.
- Phytoecia sylvatica* Hintz m. *atroapicalis* Breuning, 1950c: 44.  
2 ?PT: [Belg Kongo, Ikutha].
- Phytoecia vittata* Peringuey m. *nigrotibialis* Breuning, 1951: 423.  
?PT: [Mosambique, Zoub □ □ □].
- Phytoecia vittipennis* Reiche m. *ordubadensis* Breuning, 1947e: 60.  
?HT: Arménie, Ordubad, coll. Breuning [Caucasus, Araxesthal, Leder. Reitter];  
?PT: [Ordubad, 13 Klzr.].
- Prosopocera vitticollis* Gahan m. *vittipennis* Breuning, 1950b: 6.  
HT: ♀, Transvaal, Shilouane, leg. H. Junod, MHNG. (*Exemplaire non retrouvé dans la collection*).
- Saperda alberti* Plavilstshikov m. *latemaculata* Breuning, 1952: 187.  
HT: ♀, Hokkaido, Insel Yesso.
- Saperda fayi* Bland m. *immaculipennis* Breuning, 1952: 167.  
HT: ♂, Ontario, Ridgeway; ?PT: [ill. Ottawa?, 21.V].
- Saperda lateralis* Fabricius m. *transeuns* Breuning, 1952: 165.  
?HT: Pensylvanie, Corwells, coll. Breuning [Kansas].
- Saperda octopunctata* Scopoli m. *aurata* Breuning, 1952: 183.  
HT: ♀, Lyon.
- Saperda vestita* Say m. *immaculata* Breuning, 1976b: 740.  
HT: ♂, USA, Pennsylvania.
- Scythasis nitida* Pascoe m. *anticerufa* Breuning, 1949: 245.  
?PT: [Burma, ill., Bhurnà]; ?PT: [Malacca, Perak].
- Stenostola anomala* Bates m. *ohbayashii* Breuning, 1952: 211.  
HT: Shikoku, Omogokei, 24.VII.1932, S. Miyamoto, meiner sammlung.  
(*Etiqueté S. glenoides ohbayashi dans la collection*).  
?HT: [Japan, 13.VII.1948 / Agoumai Prof., North Honshi, Obahata]. (*Etiqueté S. anomala m. gleneoides dans la collection*).
- Stenostola callosicollis* Breuning m. *incallosa* Breuning, 1952: 205.  
HT: ♂, Mandschurei, Handaohetzy. [VI.1938]; ?PT: [idem].



*Stibara tricolor* Fabricius m. *holorufipennis* Breuning, 1961e: 160.

2 ?PT: [Tonkin, Backan].

*Thermistis croceocincta* Saunders m. *reducta* Breuning, 1952: 198 (1956d : 696).

HT: ♂, Tonkin, Dong-Van, coll. Lepesme; ?PT: [idem].

*Thyestilla gebleri* Faldermann m. *subuniformis* Breuning, 1952: 195.

HT: ♂, China, Umgebung Peking, leg. Stötzner; ?PT: [Peking, Exp. Stötzner, West berge].

*Thyestilla gebleri* Faldermann m. *transitiva* Breuning, 1952: 195.

HT: ♂, China, Provinz Kiang-si, Umgebung Kiukiang.

*Tragocephala freyi* Brancsik var. *subnubeculosa* Breuning, 1980a: 29.

PT: Anosibe, coll. Dujardin-Delacour, Tananarive [XII.68].

*Zosne cachita* Heller m. *vitticollis* Breuning, 1954a: 486.

HT: ♀, Borneo, Sandakan, leg. Baker.

## REMERCIEMENTS

Ce travail a bénéficié de l'aide logistique du département d'entomologie du Muséum d'histoire naturelle de Genève où il a été réalisé. Je remercie toutes les personnes qui m'ont assistée dans la réalisation de ce catalogue et tout particulièrement le Dr I. Löbl sous la direction duquel ce travail a été effectué. Sans ses conseils précieux, son aide considérable et sa constante disponibilité, il n'aurait pu être mené à son terme. Mes remerciements vont également au Dr C. Lienhard pour ses remarques pertinentes, au Dr C. Besuchet et à M. Rochas de Rolle pour la communication de la liste des «types» de la collection Rochas, à MM. C. Holzschuh de Vienne et P. Téocchi d'Avignon pour les références communiquées, ainsi qu'à MM. M. Danilevsky de Moscou et M. Sörensson de Lund pour les publications fournies.

## BIBLIOGRAPHIE

- AURIVILLIUS, C. 1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia 9. *Arkiv för Zoologi* 3(18): 1-40.
- AURIVILLIUS, C. 1910. Coleoptera 7. Cerambycidae 11 (pp. 139-152). In: SJÖSTEDT, Y. (ed.). Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaisteppen Deutsch-Ostafrika, 1905-1906, 1 Band. *Stockholm, P. Palmquists Aktiebolag*, 442 pp.
- AURIVILLIUS, C. 1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia 13. *Arkiv för Zoologi* 8 (22): 1-35.
- BLANCHARD, E. 1851?. Fauna Chilena. Insectos. Coleopteros. In: GAY, C. Historia física y política de Chile. Zoologia. Tomo 5. *Paris: Maulde et Renou*, 563 pp.
- BREUNING, S. (E.) 1937. Quatrième Tribu: Ceroplesini Thomson: 231-270. In: BREUNING, S. 1934-1940. Etudes sur les Lamiaires (Coleoptera: Cerambycidae). *Troisième supplément de Novitates Entomologicae, Le Moult éd., Paris*, 568 pp.

- BREUNING, S. 1942. Neue Art von *Dorcadion* aus Südtalien. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della Facolta Agraria in Portici* 32: 125-129.
- BREUNING, S. 1943. Nouveaux Cérambycides paléarctiques (1<sup>re</sup> note). *Miscellanea Entomologica* 40: 89-104.
- BREUNING, S. (E.) 1944. Nouveaux Cérambycides paléarctiques (2<sup>e</sup> note). *Miscellanea Entomologica* 41: 11-16.
- BREUNING, S. (E.) 1945. Treizième Tribu: Gnomini Thomson: 525-535. In: BREUNING, S. 1942-1945. Etudes sur les Lamiaires (Coleoptera: Cerambycidae), deuxième partie. *Troisième supplément de Novitates Entomologicae*, Le Moult éd., Paris, 615 pp.
- BREUNING, S. (E.) 1947a (1946). Nouveaux Cérambycides paléarctiques (Col.) 3<sup>e</sup> note. *Miscellanea Entomologica* 43: 21-24.
- BREUNING, S. 1947b (1946). Nouveaux Cérambycides paléarctiques (4<sup>e</sup> note). *Miscellanea Entomologica* 43: 141-149.
- BREUNING, S. (E.) 1947c (1946). Nouvelles formes de *Dorcadion* (Col. Cerambycidae). *Miscellanea Entomologica* 43: 93-132.
- BREUNING, S. 1947d (1946). Nouvelles formes de *Dorcadion* (Col. Cerambycidae) 2<sup>e</sup> note. *Miscellanea Entomologica* 43: 149-172.
- BREUNING, S. (E.) 1947e. Quelques nouvelles formes des genres *Nupserha* Thoms., *Oberea* Muls., *Conizonia* Fairm., et *Phytoecia* Muls. (Col., Cerambycidae). *Miscellanea Entomologica* 44: 57-61.
- BREUNING, S. 1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). *Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique* 24 (38): 1-44.
- BREUNING, S. 1949. Nouveaux Lamiaires du Musée de Milan. *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali del Museo Civico di Storia Naturale* 88: 243-245.
- BREUNING, S. 1950a. Nouveaux Lamiaires du Musée de Gênes (Coleoptera, Cerambycidae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale* 64: 170-201.
- BREUNING, S. 1950b. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 26 (12): 1-32.
- BREUNING, S. 1950c. Nouvelles formes de Lamiaires du Congo belge (Cerambycidae). *Annales du Musée du Congo belge, Tervuren, Sciences Zoologiques* 4: 1-46.
- BREUNING, S. 1950d. Quelques Lamiaires (Coleoptera, Cerambycidae) du Riksmuseum. *Arkiv för Zoologi* 1: 265-274.
- BREUNING, S. 1950e. Nouvelles formes de Lamiaires (Cerambycidae, Coleoptera). *The Sarawak Museum Journal* 5: 373-388.
- BREUNING, S. 1951. Révision du genre *Phytoecia* Muls. (Col. Cerambycidae). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 2: 1-103 et 353-460.
- BREUNING, S. 1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. (Col. Cerambycidae). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 3: 107-213.
- BREUNING, S. 1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 29 (8): 1-38.
- BREUNING, S. 1954a. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. (Col. Cerambycidae). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 5: 401-567.
- BREUNING, S. 1954b. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 30 (41): 1-24.
- BREUNING, S. 1954c. Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). *Parc national de l'Upemba, I. Mission G. F. de Witte (1946-1949)* 25: 69-95.
- BREUNING, S. 1955a. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire naturelle (2<sup>e</sup> note) [Col. Cerambycidae] (Suite). *Bulletin de la Société entomologique de France* 60: 70-77.
- BREUNING, S. 1955b. Beschreibung einer neuen Rasse des *Dorcadion divisum* Germ. (Ceramby., Coleoptera). *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* (series nova), 6: 263.

- BREUNING, S. 1955c. Révision du genre *Mecas* Le Conte (Col. Ceramb.). *Mémoires de la Société royale d'Entomologie de Belgique* 27: 138-152.
- BREUNING, S. 1955e. Neue Lamiinae aus dem South African Museum (Coleoptera, Cerambycidae). *Annals of the South African Museum* 41: 345-357.
- BREUNING, S. 1956a. Deux nouveaux Lamiaires de Sumatra et deux nouvelles formes de *Dorcadion* du Musée de Budapest (Coleoptera, Cerambycidae). *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, (series nova)* 7: 403-404.
- BREUNING, S. 1956b. Revision der Gattung *Glenea* Newm. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 7: 1-199 et 671-893.
- BREUNING, S. 1956c. Longicornes nouveaux de la collection du Museo Civico di Storia Naturale-Genova (Coleoptera, Cerambycidae). *Annali del Museo Civico di Storia naturale Giacomo Doria* 68: 244-258.
- BREUNING, S. 1956d. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2<sup>e</sup> note). *Longicornia III*: 665-702.
- BREUNING, S. 1956e. Notes sur les Lamiaires. *Longicornia III*: 703-722.
- BREUNING, S. 1956f. Die Ostasien-Cerambyciden im Museum A. Koenig, Bonn. *Bonner Zoologische Beiträge* 7: 229-236.
- BREUNING, S. 1956g. Nouvelles formes de Lamiaires (Huitième partie). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 32 (25): 1-23.
- BREUNING, S. 1957a. Revision des Agapanthiini africains (Cerambycidae, Col.). *Bulletin de l'Institut français d'Afrique Noire, Série A, Sciences naturelles* 19 (3): 792-869.
- BREUNING, S. 1957b. Nouveaux Lamiaires du Congo Belge (Coleoptera Cerambycidae). *Revue de Zoologie et de Botanique africaines* 56: 203-206.
- BREUNING, S. 1958a. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire naturelle (3<sup>e</sup> note) [Col. Cerambycidae] (suite et fin). *Bulletin de la Société entomologique de France* 63: 31-37.
- BREUNING, S. 1958b. Revision der Gattung *Glenea* Newm. (Col. Ceramb.) (2. Fortsetzung). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 9: 229-351.
- BREUNING, S. 1958 (1957). Insectes Coléoptères Cerambycidae Lamiinae. Faune de Madagascar, 4. Institut de Recherche Scientifique, Tananarive-Tsimbaza, 401 pp.
- BREUNING, S. 1958-1969. Catalogue des Lamiaires du Monde (Col. Céramb.), 1-11 Lieferung. Verlag des Museums G. Frey, München, 1069 pp.
- BREUNING, S. 1959a. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 35 (6): 1-14.
- BREUNING, S. 1959b. Neue Cerambyciden aus den Sammlungen des zoologischen Museums der Humboldt-Universität zu Berlin (Coleoptera, Cerambycidae). Erster Teil. *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin* 35: 149-175.
- BREUNING, S. 1960a. Neue Lamiiden aus dem staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden (Coleoptera, Cerambycidae). *Abhandlungen und Berichte aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden* 25: 3-16.
- BREUNING, S. 1960b. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 36 (7): 1-30.
- BREUNING, S. 1960c. Mission zoologique de l'I.R.S.A.C. en Afrique orientale. (P. Basilewsky et N. Leleup, 1957). XX. Coleoptera Cerambycidae. *Annales du Musée du Congo belge, Tervuren, Sciences Zoologiques* 81: 321-341.
- BREUNING, S. 1961a. Neue Cerambyciden aus den Sammlungen des zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin (Coleoptera, Cerambycidae). *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin* 37: 297-328.
- BREUNING, S. 1961b. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe (Coleoptera Cerambycidae). Deuxième partie, VII. Description des espèces. *Frustula Entomologica*: 61-140.
- BREUNING, S. 1961c. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 37 (20): 1-44.



- BREUNING, S. 1961d. Nouveaux Lamiaires d'Afrique centrale (Coleoptera Cerambycidae Lamiinae). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 63: 249-257.
- BREUNING, S. 1961e. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden (Col.). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey* 12: 140-160.
- BREUNING, S. 1962a. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe (Coleoptera Cerambycidae). *Frustula Entomologica*: 141-232, I-VI.
- BREUNING, S. 1962b. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 38 (40): 1-16.
- BREUNING, S. 1962c. Revision der Dorcadionini. *Entomologische Abhandlungen und Berichte aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden* 27, 665 pp.
- BREUNING, S. 1963a. Nouvelles formes de Lamiaires (Quinzième partie). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 39 (34): 1-11.
- BREUNING, S. 1963b. Contribution à la connaissance des Lamiens du Laos [Coll. (sic) Céramb.] (Cinquième Partie). *Bulletin de la Société royale des Sciences naturelles du Laos* 6: 37-53.
- BREUNING, S. 1963c. Contribution à la connaissance des Lamiens du Laos [Coll. (sic) Céramb.] (Sixième Partie). *Bulletin de la Société royale des Sciences naturelles du Laos* 7: 3-22.
- BREUNING, S. 1964a. Descriptions de nouveaux Lamiaires (Col. Cerambycidae). *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 95-103.
- BREUNING, S. 1964b. Nouvelles formes de Lamiaires (Seizième partie). *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 40 (10): 1-8.
- BREUNING, S. 1965a. Contribution à la connaissance des Lamiens du Laos [Coll. (sic) Céramb.] Onzième partie. *Bulletin de la Société royale des Sciences naturelles du Laos* 12: 41-62.
- BREUNING, S. 1965b. Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). *Reichenbachia Staatliches Museum für Tierkunden in Dresden* 5: 283-284.
- BREUNING, S. 1965c. Contribution à la connaissance des Lamiens du Laos [Coll. (sic) Céramb.] 14<sup>e</sup> partie. *Bulletin de la Société royale des Sciences naturelles du Laos* 15: 21-46.
- BREUNING, S. 1966a. Revision der Agapanthiini der eurasiatisch-australischen Region (Coleoptera, Cerambycidae). *Entomologische Abhandlungen (Dresden)* 34: 1-144.
- BREUNING, S. 1966b. Deux nouvelles espèces de Saperdini de ma collection (Coleoptera, Cerambycidae). *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 53-54.
- BREUNING, S. 1966c. Quelques nouvelles formes de Lamiinae de la collection Mussard (Coleoptera, Cerambycidae). *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 14-16.
- BREUNING, S. 1967a. Nouveaux Longicornes du Muséum d'Histoire naturelle de Genève (Col. Cerambycidae). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 40: 27-36.
- BREUNING, S. 1967b. Description d'une espèce et de quatre variétés nouvelles de Saperdini de ma collection (Col. Cerambycidae). *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 40.
- BREUNING, S. 1968a. Contribution à la connaissance des Lamiens du Laos [Coll. (sic) Céramb.] 15<sup>e</sup> partie et fin. *Bulletin de la Société royale des Sciences naturelles du Laos* 16: 3-64 + addenda: 1p.
- BREUNING, S. 1968b. Contributions à la connaissance de la faune entomologique de la Côte d'Ivoire (J. Decelle, 1961-1964), 21, Coleoptera Cerambycidae Lamiinae. *Annales du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren* 165: 297-355.
- BREUNING, S. 1969a. Nouveaux Longicornes du Muséum d'Histoire naturelle de Genève, II, (Col. Cerambycidae). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 42: 34-37.
- BREUNING, S. 1969b. Nouveaux Coléoptères Cerambycidae Lamiinae des collections du Muséum de Paris. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle, 2<sup>e</sup> série* 41: 187-199.
- BREUNING, S. 1970a. Nouveaux Coléoptères Cerambycidae Lamiinae des collections du Muséum de Paris (suite). *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle* 42: 363-377.

- BREUNING, S. 1970b. Nouveaux Coléoptères Cerambycidae Lamiinae des collections du Muséum de Paris (suite). *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle* 42: 460-488.
- BREUNING, S. 1970c (1971). Nouveaux Coléoptères Cerambycidae malgaches des collections du Muséum de Paris. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle* 42: 662-684.
- BREUNING, S. 1970d. Description d'une nouvelle race du genre *Mallosia* Muls. (Col. Cerambycidae). *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 30.
- BREUNING, S. 1970e. Descriptions de Lamiinae nouveaux de l'Afrique Centrale (Coleoptera Cerambycidae). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 82: 171-173.
- BREUNING, S. 1971a. Description de trois espèces de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) de Nouvelle-Guinée et du Laos. *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique* 47 (33): 1-3.
- BREUNING, S. 1971b. Description de nouveaux Lamiinae de Ceylan (Col. Cerambycidae). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 44: 303-306.
- BREUNING, S. 1971c. Descriptions de Lamiinae nouveaux du Musée Royal de l'Afrique Centrale (Coleoptera Cerambycidae). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 83: 381-383.
- BREUNING, S. 1972a. Descriptions de Lamiinae nouveaux d'Afrique (Coleoptera Cerambycidae). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 85: 280-286.
- BREUNING, S. 1972b. Quelques rectifications systématiques sur les Lamiinae (Col. Cerambycidae). *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 50.
- BREUNING, S. 1972c (1971). Lamiinae nouveaux du nord de l'Inde récoltés par le Dr F. Schmid (Col. Cerambycidae). *Archives des Sciences Genève* 24: 415-422.
- BREUNING, S. 1973a. Lamiinae nouveaux d'Afrique Centrale (Coleoptera Cerambycidae). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 87: 96-98.
- BREUNING, S. 1973b. Lamiinae nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris [Col. Cerambycidae]. *Annales de la Société entomologique de France (N. S.)* 9: 647-665.
- BREUNING, S. 1973c. Beschreibung zweier neuer Arten der Gattung *Dorcadion* (Col., Cerambycidae, Lamiinae). *Entomologische Zeitschrift* 83: 54-55.
- BREUNING, S. 1974a. Quelques nouvelles espèces de Lamiinae du Muséum d'histoire naturelle de Genève (Coleoptera, Cerambycidae), I. *Revue suisse de Zoologie* 81: 73-75.
- BREUNING, S. 1974b. Quelques nouvelles espèces de Lamiinae du Muséum d'histoire naturelle de Genève (Coleoptera, Cerambycidae), II. *Revue suisse de Zoologie* 81: 371-375.
- BREUNING, S. 1974c. Descriptions de nouvelles formes de Lamiinae d'Ethiopie (Coleoptera Cerambycidae). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 88: 413-420.
- BREUNING, S. 1974d. Descriptions de Lamiinae africains nouveaux (Coleoptera Cerambycidae). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 8: 775-777.
- BREUNING, S. 1974e. Neue Arten und Gattungen von Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin* 50: 149-165.
- BREUNING, S. 1974f. Neue Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin* 50: 237-241.
- BREUNING, S. 1974g. Nouveaux Mesosini des collections du Muséum national d'Histoire naturelle (Col. Cerambycidae Lamiinae). *Bulletin de la Société entomologique de France* 79: 72-79.
- BREUNING, S. 1975. Contribution à l'étude des Cerambycidae Lamiinae du massif de l'Andringitra, Madagascar Centre (Col.). *Bulletin de la Société entomologique de France* 80: 258-265.
- BREUNING, S. 1976a. Nouveaux Apomecynini des collections du Muséum National d'Histoire naturelle, Paris (Col. Cerambycidae Lamiinae). *Bulletin de la Société entomologique de France* 81: 207-208.
- BREUNING, S. 1976b. Quelques nouvelles espèces de Lamiinae du Muséum d'histoire naturelle de Genève, III. (Coleoptera, Cerambycidae). *Revue suisse de Zoologie* 83: 737-741.
- BREUNING, S. 1977a. Nouveaux Lamiinae africains des collections du Muséum de Paris (Col. Cerambycidae). *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle, 3<sup>e</sup> série, n° 434, Zoologie* 304: 265-303.



- BREUNING, S. 1977b. Recherches sur le littoral de la Somalie. La plage et la dune de Sar Uanle. 15. Note sur les Lamiinae (Coleoptera Cerambycidae), (Pubblicazioni del centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali del C.N.R.: CXXXIV). *Monitore Zoologico Italiano* [N. S.] 9: 291-298.
- BREUNING, S. 1978a. Description de nouvelles espèces de Lamiinae de Nouvelle Calédonie, I. *Folia Entomologica Hungarica, Rovartani Közlemények (Series nova)* 31: 23-29.
- BREUNING, S. 1978b. Description de nouvelles espèces de Lamiinae de Nouvelle Calédonie, II. *Folia Entomologica Hungarica, Rovartani Közlemények (Series nova)* 31: 67-71.
- BREUNING, S. 1978c. Nouvelles espèces de Lamiinae (Cerambycidae) de la coll. Vives. *Miscellanea Zoologica* 4: 131-136.
- BREUNING, S. 1978d. Descriptions de Lamiinae africains nouveaux (Coleoptera Cerambycidae). *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 92: 93-116.
- BREUNING, S. 1979a. Beschreibung einer neuen Species der Gattung *Dorcadion* (Col.: Cerambycidae). *Entomologische Zeitschrift* 89: 92-93.
- BREUNING, S. 1979b. Nouveaux coléoptères Cerambycidae Lamiinae des collections du Muséum de Paris (1<sup>ère</sup> note). *Revue française d'Entomologie (F.S.)* 1: 99-100.
- BREUNING, S. 1980a. Diagnoses préliminaires de nouveaux Lamiinae de Madagascar [Coleoptera, Cerambycidae]. *Revue française d'Entomologie (N.S.)* 2: 29-41.
- BREUNING, S. 1980b. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux (Col.). *Bulletin de la Société entomologique de France* 85: 67-71.
- BREUNING, S. 1980c. Nouvelles espèces de Lamiinae d'Asie orientale (Col. Cerambycidae). *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 49-50.
- BREUNING, S. 1980d. Nouvelle espèce de Lamiinae des Iles Seychelles. *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 50.
- BREUNING, S. 1980e. Description de nouvelles espèces de Lamiinae des Philippines (Coleoptera, Cerambycidae). *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin* 56: 157-182.
- BREUNING, S. 1981a. Beschreibungen neuer Lamiinae des Transvaal Museums, Pretoria (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia entomologica Hungarica* 34(2): 35-54.
- BREUNING, S. 1981b. Descriptions supplémentaires de Lamiinae, Sud Africains nouveaux (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia entomologica Hungarica* 34(2): 55-59.
- BREUNING, S. 1981c. Description d'une nouvelle race du genre *Oberea* Muls. (Cerambycidae). *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*: 26.
- BREUNING, S. 1982. Diagnoses préliminaires de nouveaux Lamiinae du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris [Coleoptera, Cerambycidae]. *Annales de la Société entomologique de France (N. S.)* 18: 9-29.
- BREUNING, S. 1984. Stephan von Breuning 1894-1983, Notice autobiographique & Liste des publications. *Bulletin de la Société Sciences Nat* 41: 1-17.
- BREUNING, S. 1986. Annotated list of Cerambycidae, subfamily Lamiinae collected in Tanzania, Zambia and Botswana 1969-80 with description of 86 new taxa. In: FORCHHAMMER, P. & BREUNING, S. *Natura Iutlandica* 22: 43-68.
- DEMELT, C.v. 1963a. Beitrag zur Kenntnis der Cerambycidenfauna Kleinasien und 13. Beitrag zur Biologie palaearkt. Cerambyciden, sowie Beschreibung einer neuen *Oberea*-Art. *Entomologische Blätter* 59: 132-151.
- DEMELT, C.v. 1963b. Eine neue Form der *Phytoecia* (Subgen. *Helladia* Frm.) *millefolii* Ad., *Phytoecia millefolii* Ad. m. *obscuripennis* m. n. *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen* 15: 96.
- DILLON, L.S. & DILLON, E.S. 1948. The Tribe Dorcaschematini (Coleoptera: Cerambycidae). *Transactions of the american entomological Society* 73: 173-298.
- FÄHRÆUS, O. I. 1872. Coleoptera Caffrariae, annis 1838-1845 a J. A. Wahlberg collecta. Longicornia descriptis. öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademien Föreläsningar 29: 29-61.
- FIEDLER, H. 1938. Systematik und Zoogeographie von *Ceroplesis* (afrikan. Lamiinae, Col.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 4: 571-616.

- HAYASHI, M. 1962. The Cerambycidae from Amami-Oshima Islands. III. Additions to the Cerambycid-fauna of the Loochoo-Archipelago, 2 (Col.). *The Entomological Review of Japan* 14: 35-41.
- HELLER, K. M. 1934. New and little-known Philippine Coleoptera. *Philippine Journal of Science* 54: 279-308.
- HEYROVSKY, L. 1948. Contribution à la faune des Longicornes de la Palestine. (Col. Ceramb.). *Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae* 45: 17-22.
- HEYROVSKY, L. 1952. Beitrag zur Kenntnis der Japanischen Cerambyciden. *The Entomological Review of Japan* 6: 12-13.
- HINTZ, E. 1920 (1918). Die Cerambycidengattung *Ceroplesis* Ser. (Col.). *Archiv für Naturgeschichte* 84, A/10: 162-176.
- HOLZSCHUH, C. 1971. Zwei neue *Phytoecia*-Arten (Col. Cerambycidae) aus Anatolien und dem Libanon. *Mitteilungen der Forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Wien* 94: 67-69.
- HOLZSCHUH, C. 1974 (1973). Neue Bockkäfer aus Pakistan, Iran, Anatolien und Mazedonien (Coleoptera, Cerambycidae). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen* 25(3-4): 81-100.
- HOLZSCHUH, C. 1977. Neue Bockkäfer aus Anatolien und Iran (Col. Cerambycidae). *Koleopterologische Rundschau* 53: 127-136.
- HOLZSCHUH, C. 1984. Beschreibung von 21 neuen Bockkäfern aus Europa und Asien (Cerambycidae, Col.). *Koleopterologisch Rundschau* 57: 141-165.
- HÜDEPOHL, K-E. 1996. Über südostasiatische Cerambyciden, XIV (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Entomofauna* 17(1): 1-24.
- HÜDEPOHL, K-E. 1992. In: HÜDEPOHL, K-E. & SMETANA, A. A new apterous Lamiinae from The Mt. Kinabalu National Park, Sabah, Borneo (Coleoptera: Cerambycidae). *Koleopterologische Rundschau* 62: 179-182.
- KOLBE, M. J. 1893. Beiträge zur Kenntniss der Longicornier (Coleoptera). *Stettiner Entomologische Zeitung*: 59-80.
- LEPESME, P. & BREUNING, S. 1953. Lamiaires nouveaux de Côte d'Ivoire [Col. Cerambycidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France* 58: 98-104.
- LEPESME, P. & BREUNING, S. 1955. Coléoptères Cerambycides récoltés par MM. De Miré et Coste dans la région saharo-sahélienne. *Bulletin de l'Institut français d'Afrique noire, série A, Sciences naturelles* 17(3): 847-855.
- LEPESME, P. & BREUNING, S. 1956. Cérambycides récoltés par Mr. R. Mussard en Côte d'Ivoire et au Congo Belge. *Longicornia III*: 659-662.
- OHBAYASHI, K. 1956. Two new species of the genus *Oberea* from Japan. *Longicornia III*: 761-763.
- PÉRINGUEY, L. 1888. Second contribution to the South-African Coleopterus Fauna. *The Transactions of the South African Philosophical Society*: 66-195.
- PIC, M. 1895. Sur les *Phytoecia* voisins de *punctum* Mén. et *ephippium* Fab. Addenda. *L'Echange, Revue Linnéenne* 126: 63-70.
- PIC, M. 1890. Communications. *Bulletin des séances et bulletin bibliographique de la Société entomologique de France* 1890: 41.
- PIC, M. 1900. Description de Coléoptères circum méditerranéens et exotiques. *L'Echange, Revue Linnéenne* 183: 19-20.
- PIC, M. 1905. Sur *Phytoecia (Musaria) balcanica* Friv. et formes voisines. *Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes* 5: 37-38.
- REITTER, E. 1889. Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*: 17-44.
- REITTER, E. 1895. Zwölfter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. *Weiner Entomologische Zeitung*: 149-162.
- SCHWARZER, B. 1925. Sauters Formosa-Ausbeute (Cerambycidae. Col.) (Subfamilie Lamiinae). *Entomologische Blätter* 21: 145-154.

- SUDRE, J. 1997. *Anexodus sarawakensis* n. sp., une espèce nouvelle de Bornéo (Col., Cerambycidae, Lamiinae). *Bulletin de la Société entomologique de France* 102: 253-254.
- SUDRE, J. 2000. Description de trois nouveaux genres de Parmenini de Nouvelle-Calédonie (Coleoptera, Cerambycidae). *Bulletin de la Société entomologique de France* 106: 79-84.
- SUDRE, J. & TEOCCHI, P. 2000. Révision de la tribu des Phantasini (Col. Cerambycidae, Lamiinae). *Ed. Magellanes, Andréys. Collection systématique* 4, 82 pp.
- SUVOROV, G. L. 1909. Beschreibung neuer Arten der Gattung *Neodorcadion* Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). *Revue Russe d'Entomologie* 9: 80-92.
- VUILLET, A. 1912. Une nouvelle espèce du genre *Dasyllinda* Thomson (Col. Cerambycidae). *Insecta* 2: 20-21.
- WESTWOOD, J.O. 1848. A selection of some of the rarer and more beautiful species of insects, natives of India and the adjacent islands, the greater portion of which are now for the first time described and figured. *The cabinet of oriental entomology*, W. Smith, London, 88 pp.